



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





UNIVERSITE



Digitized by Google



H.N. 617

H.N. 617

HN. 617


GEORGII

AGRICOLAE

DE ANIMANTIBVS

subterraneis

Liber.



M▷ D▷ XLIX▷



GEORGIVS

AGRICOLA GEORGIO

Fabricio S. P. D.

Q Vanquam duos libros de stirpibus scripsit Aristoteles, tamen ijs Theophrastum discipulū nō deterruit, quo minus suā de iisdem stirpibus sententiam multis libris explicaret. Nec ipse Theophrastus tanta scientia tātaq; copā studiū Dioscoridis ardoremq; restinxit: sed etiam is posteritati seruiens quarundam arborum ac herbarum figuras & vires, longo atq; multo usu perceptas, literis memorięq; mandauit. Male enim se habuissent studia, si ætate inferiorib. ad ea quæ à maioribus erant inuenta, nihil addere licuisset, certe si Græci hanc legem iniquam quondam accepissent, nulla ars, nulla scientia, nulla disciplina potuisset perfici. Quapropter etsi Aristoteles libros complures edidit, in quibus animantium naturas, partes, ortus ratione & uia est perfectus

cutus: tamē philosophiæ deditos auocare nec uoluit, nec debuit, à studio tū perquirendi posterisq; prodēdi naturas earum animantium, de quibus parum aut nihil scripsit: tum tractandi locos, quos in nŕs libris nō satis expressit. Itaq; etiam apud Græcos Oppianus scripsit de piscibus, de animantium natura Porphyrius & Aelianus; apud Latinos item de piscibus Ouidius, de omnibus ferē animantibus Plinius. Quos scriptores ego secutus cum res subterraneas, quæ animæ carent, exposuissem pluribus libris, ut rationem institutam, quoad fieri posset, absoluerem, animantes etiam descripsi subterraneas. nec eas modo quæ perpetuo ferē uersantur in terra, sed eas quoq; quæ certis anni temporibus in eadem solent latēre. Quo sanē modo et bestiarum quarūdam formas Aristoteli & alijs uel incognitas, uel parum expressas, & illius locum de animantibus, quæ hybernis se condunt mensibus, uolui latius explicare. Hunc librum si probauero tibi, qui Latinis & Græcis literis in primis erudi

ruditus, animantium naturas scrutaris,
& iam multarum cognitionem cepisti,
eū facilius, ut spero, ceteris qui itē rerū
occultarū studio delectantur, probabo.

Vale Kempnicĭ, III Idus Aug.

Anno M. D. XLVIII

a 3

HI SVNT SCRIPTORES, QVORUM
inuentis usus sum, & qui me
ad hanc experientiam
excitarunt.

Aelianus	Lucanus
Albertus	
Alexāder Aphro-	Martialis
diensis	
Ammonius	Nicander
Aristoteles	
Aristophanes	Oppianus
Athenæus	Ouidius
Charisius	Plautus
Cicero	Plinius
Columella	Pfellus
Corn. Tacitus	
Dioscorides	Seneca
	Strabo
Galenus	Theophrastus
Homerus	Varro
Horatius	Virgilius
Iornandes	Xenophon

GEORGII AGRICOLAE DE ANIMANTIBVS subterraneis Liber.



CORPVS subterraneum, ut res ipsa demonstrat, in animatum distribuitur, & inanimatum. quod autem animi expers est, rursus diuiditur in id quod sua sponte erumpit ex terra, & in id quod ex eadem effoditur. De altero inanimi genere dixi in quatuor libris de natura eorum quæ effluunt ex terra inscriptis, de altero in decem de natura fossilium: nunc de subterraneis animantibus dicam. Cum uerò genus animantium omne constet ex quatuor elementis, & corpus humidum ac siccum, id est aqua & terra, ad accipiendum apta sint, necesse est ea ipsa duo elementa animantium materiam esse. Ex quo rursus illud quadam naturæ necessitate consequitur, ut omne animal & in aqua uel terra gignatur, & in eis commoretur atque uita fruatur. Nam bestię uolucres,

et si passim per aerem uolitant, tamen in terra, uel in stirpibus ex ea natis, uel in edificijs super ipsam collocatis, construunt nidos, & eis aut terra aut aqua cibos suppeditat. Vt enim uerum sit quod perhibent, aues luteas, raras illas, et nō adeo magnas, quarum pennas insignes, item luteas & splendentes, rex Turcarum in superiore capitis parte integumentis inuoluta gestat, in aere perpetuū uitæ cursum tenere, foeminam ouis quæ parit, super marem locatis incubare & pullos excludere, neutram uiuam unquam pede terram attingere, quod fistulam habeāt per corpus penetrantem, qua aerē transmittunt, tamen solo aere nec alii uidentur posse, nec augescere, sed his quibus uescuntur. Ac uerò etiam bestiola, quæ *πυρρίππος*, propterea quod in terreno isto igni gignuntur, à Gracis nominatur, terra & aqua non carent. gignuntur autem, ut Aristoteles scribit, in his Cypri fornacibus, in quibus lapis ærarius multos dies crematur: atq; magnis muscis paulo maiores sunt & subalatae. In igni ambulant & saliant, sed emoriūtur
quā

quàm primū ab eo dimotæ fuerint. Animantium partim, tametsi latere soleant, non subeunt terræ rimas, nec foramina, nec speluncas: quæ in subterranearū numero non sunt. partim noctu, aut interdū subterraneas succedūt cauernas, partim certo anni tempore; quarū utræque eo ipso diei uel anni tempore subterraneæ sunt, atq; dici possunt. partim ferè perpetuo occulte in terra latēt: quæ subterraneæ & semper sunt, & proprie dicuntur. Vt autem res expressior & illustrior fiat, paulo altius ordiar. Quoniam animātes omnes natura mutationes temporum sentiunt, pleræq; frigoris aut caloris uitandī causā uel regionē locūque mutant: uel ingrediuntur in domicilia, aut arbores exesas & excauatas: uel subeunt terram. Earum autem quæ regionem mutant, aliæ semel egressæ nunquā reuertuntur, alię reuertuntur, nunquam redire solent rationis participes, hoc est homines. Etenim hi non modo frigoris aut caloris uitandī causā alibi sedē collocant, uerum etiam ex regionibus macris & nihil ferentibus migrant in opimas & fertiles

fertiles: uel cum tanta multitudo fuerit orta, quantam non satis cōmode alit regio, partim aliò ad habitandū eunt. Quo sanè modo alia ora parsq; terrarū onus, quo premitur, in alia sæpe deponit. quibus de causis Scādia, peninsularum omnium maxima, olim magnā Gothorum copiam unā cum coniugibus & liberis effudit in Sarmatiam & Daciam. Cimbros uerò & Teutones ex ultimis Galliae Belgicae oris, in quas è Germania cōmigrarunt, maris inundationes exegerunt. Et eadem ac terrae motus atq; eruptiones ignium & aquarū calidarum effusiones ex Aenaria colonos, quos Hiero tyrānus Syracusanus eò miserat. Atq; his ferè de causis gentes aut uictae ab his quae migrarunt, expelluntur & eijciunt ex proprijs sedib. ac possessionibus, uicissimq; etiā ipsae in alienas irruūt & eas occupant: aut subactae & bello domitae uictoricibus seruiūt: aut tam uictae quàm uictrices communi conditione libertatis eandem regionē obtinent. Simili modo animātes rationis expertes, maxime uolucres, ex regionibus in quibus & na-
tae

te sunt & uiuere consueuerūt, nunquam
redituræ in exteras se conferunt: et si ra-
rius. Quo pacto ab hinc annos sex locu-
stæ, diræ herbarum, leguminum, segetū,
stirpium, quas uastant, pestes, gregatim
inuolarunt in Pannonias, in Daciam, in
ueterem regionem Marcomannorum,
Lygiorumq;: ut quondam etiā sæpe ex
Africa in alias Europæ oras. Quin ut in-
terdum unicus homo in longinquas re-
giones abit, nec redit unquam, ita unum
solum animal. quo modo annos abhinc
propè uiginti in Norico captum est ani-
mal canis uillis uestitum: cuius, ut cephi
Æthiopici, prioribus pedibus similitu-
do erat cum humanis manibus: postero-
ribus cum humanis pedibus. Et Alberti
cognomento Magni temporibus in Sla-
uorum syluis comprehensæ sunt animan-
tes duæ mas & foemina, quarum pedes
priores item erāt similes manibus huma-
nis: posteriores pedibus humanis. eas ue-
rò ipse putauit esse in simiarum genere.
Ac ibim Aegyptiam in Alpibus à Mar-
co Egnatio Caluino præfecto uisam Pli-
nius memoriæ prodidit. Aquilam quoq;
Nort

Northusæ in Toringia, quum ibi con-
nuisset mortuam scimus. Hoc etiam an-
no, qui est octauus & uicesimus imperij
Caroli quinti, Ianus quidã Dincelspy-
helenis aquilam profligatam occidit, et
quasi donum senatui attulit. quæ aquila
in eum in equo sedentem, pridie Epipha-
niæ prope Rotelin oppidũ impetu tam
uiolento inuolauit, ut non procul abes-
set à periculo uitæ. Eodem modo uerifi-
mile est aliquos etiam pisces, cum semel
reliquerunt mare, in fluuios, qui per lon-
ginquas regiones fluunt ingredi, & nun-
quam in idem redire. Haftenus de
generibus animantium dixi, quæ in re-
gionem è qua egressæ sunt nõ reuertun-
tur: nunc dicam de his quæ reuerti solent,
quæ & eadẽ sunt, & eadem ferè de cau-
sa, caloris scilicet uel frigoris uitadi, à re-
gione, cuius incolæ sunt, semigrant: &
quidem estate in locis frigidis, hyeme in
sepidis morantur. Etenim homines qui
ualetudini dant operam, ut tueri se pos-
sint à calore, in æstiuis sunt: ut à frigore,
in hybernis. qui mos in primis fuit Ro-
manis. Atq; etiam reges & domini mul-
tarum

tarum gentium æstate in alias terras abeunt, in alias hyeme. nam reges Persarū olim hyberno tempore Babylone degabant, uerno Susis, æstiuo in Ecbatanis. Eodem modo bestię uolucres & aquatiles solum mutant & secedunt: quarum alię in his ipsis regionibus et locis, in quibus æuū agere consueuerunt, refrigerationem in æstate, in hyeme teporem solent persequi: alię in longinquis & ultimis. Ac ferē uolant, natant, eunt ad habitandum in locis, in quibus aer ita sit temperatus, ut cibos ferat uel suggerat. quorum nascendī facultatem eis adimit terra, quando frigore obriguīt, uel calorem exaruit: aqua eos non suppeditat, quando conglaciauit. Aues enim quædā æstiuo tempore in syluis, hyemalī ad horrea & tecta plerunq; commorantur: ut pica, cornix, lurida, quam *ἰκτερος* Græci, Latini uocāt galgulum. quędam cum æstate eū agant in syluis, hyeme demigrant in finitimos locos apricos, montium recessus secutę: sicuti uultures, milui, sturmi, turdi, merule, palumbes, upupe. aquatiles etiam uolucres temporibus hybernis

nis se conferūt ad lacus & fluuios, in atr-
stri partibus sitos, qui frigore nō conge-
lant: aut ad aliquam fluminum partem,
cui aqua nō congelat: ut ardeolæ, mer-
gi, corui aquatici, onocrotali, fulicæ, anā-
tes immanfueta, querquedula: quedam
ab ultimis quasi terris discedunt in ulti-
mas: ueluti grues. Etenim, quod Aristo-
teles tradit, ex Scythiæ campis profici-
scūtur ad paludes Aegypto superiores,
unde Nilus profluit. Abeunt etiam lon-
gius olores, ciconiæ, immāsueti anseres.
Pauce uerò aues hyeme in syluis manēt,
ut tetraones, attagenes: minus multæ in
agris, quarum in numero sunt perdices.
Item piscium alij, ut uitare possint solis
calores, æstate de littore abeūt in altum:
& contrā, ut consectari queant teporem
hyeme ex alto, in quo se merferāt, emer-
gunt, ac in littore uersantur: ueluti del-
phini: alij ex mari ingrediuntur in mare,
ut thynni hyberno tempore ex Pon-
to in magnum mare: & contrā uerno
ex magno mari in Pontum. Alij eodem
tempore in fluuios, ut salmones, esoces,
thynni, sturiones. Atque hæ animan-
tes

tes subterraneæ dici non possunt: ut nec
ullæ aliæ quæ terræ cauernas non succe-
dunt: etiam si frigoris uitædi causa hyber-
nis mensibus, caloris æstiuus occultentur
& lateant, quales sunt in hominum gene-
re qui multum frigidas aut calidas regio-
nes habitant. nam qui illas hyberno tem-
pore, qui has æstiuo in domibus latet, in
quadrupedum genere erinacei: hyeme
enim se cōdunt in cauas arbores, in quas
autumno poma comportarunt. Simili-
ter glires & mures Pontici, ac serpentes
quidam se condunt in cauas arbores: sed
hi ipsi maxima ex parte, ut postea dicā,
faxorum cauernas succedunt. Quædam
etiam blattæ & aselli rimis parietum &
domorum latebris occultantur. Formi-
cæ quoq; conduntur in acefuis, in quibus
congerendis uere & æstate multum ope-
ræ & laboris consumpserunt. Apes i-
tem hyeme ingrediuntur in alueos: cra-
brones syluestres in cauernas & quosdā
quasi nidulos arborum: uespæ in earun-
dem domorumue nidulos, quos æstate
construxerūt. Similiter hyeme latent in
cauis arboribus non paucæ uolucres, ut
cuculus

cuculus, picus, coruus, cuius caput rubra macula insigne, qui propterea *κρυφόνος* à Græcis nominatur, upupæ quædam. At hirundines tam domesticæ quæ agrestes in loca uicina quæ sunt tepidiora secedunt; quæ si defuerint eis, se in angustis montium locis cōdunt, in quibus aliquando etiam sturni, palumbes, turtures, merulæ, turdi, alaudæ, upupæ latere consueuerunt. Siue autem in arboribus siue in montib. latuerint, ea de causa uero tempore deplumes solent conspici. Satis multa, & fortassis plura quàm instituta ratio postulabat, dixi de his animantibus quæ caloris frigorisue uitandæ causa non subeunt terræ neque rimas neque foramina, neque speluncas. Quanquam quæ dicta sunt, ita apte natura cum his quæ sequuntur coherent, ut distracta uix possint satis cōmode explicari. Igitur animantium, quarum gratia potissimum hūc scribendi laborem suscepi, tria sunt genera. Quædam enim uel noctu uel interdum subeunt terræ cauernas, atque in eis delitescunt, dormiuntue: sed pleræque omnes etiam hyeme egrediuntur ad pastum capescendum.

quædam

quædam certo anni tēpore subterraneas
succedunt cauernas, & in eis graui som-
no pressæ aliquot menses consumunt.
Quædam ferè perpetuo occulte in terra
latent, primi generis non solum terrenæ
sunt, sed etiam uolucres. uerum terrenas
primò persequar. Earum autē in nume-
ro habētur homines cauernas succeden-
tes, qui ex eo nominantur Troglodytæ.
quorum alij eas cauernas subeunt calo-
ris uitandi causa, ut qui in Africa habi-
tant ad mare rubrum: alij frigoris, ut qui
in Asia post Caucasum montē incolunt
planiciem septētriones uersus sitam: &
syluestres homines, qui in Scandiæ re-
gione Scricfinnia noctu nautis infesti
sunt: quos ij rogis ardentibus abigunt.
In Armenia etiam maiori, ut Xenophō
optimus author scribit, sunt domus sub-
terraneæ, quarum ostium putei instar an-
gustum est, inferior pars lata: aditus iu-
mentis sunt fossiles, homines descendūt
gradibus. Quin in Tenedo insula pisca-
tores hodie rupium speluncis pro domi-
bus utūtur: ut quondam Sybilla Cumæa
antro illo ad Auernum lacum tam musi

b

uo

uo opere insigni ꝓ uaticinationibus nobili. Et Circe, mulier cantionibus clara, habitauit ὧν ἀντίοσι γλαφυροῖσι, ut Homerus canit. In Sedunis etiam in tractu Sit-
tensi ad Bremisam pagum ex rupe exci-
sa sine ullis tignis & trabibus ligneis for-
matum est integrum cœnobium, hoc est
templum, cubicula, conclaue, culina, cel-
la uinaria. Similiter in altis mōtibus con-
spiciuntur arces subterraneæ: ut quæ in
Saxonia inter Blancheburgum & Hal-
berstadium est: quæ in Toringia inter Vi-
mariam et Blanchenhainam prope Mel-
lingum pagum: illius nomen est Reine-
steinum uetus; huius Pufhardum: atque
ea distat à Vimaria quatuor milib. pas-
sum. utraq; ab habitatoribus nunc de-
serta est & uacua: utraq; habet in saxo in-
cisa hypocaustra, conclauia, scamna, sta-
bula, præsepia, ianuas, fenestras: Saxoni-
ca uerò etiam templum, supra quod in-
colæ exstruxerunt speculam, quæ sola
subiecta fuit sub aspectū. Hoc templum
testudinis figura, & pila mediâ rotunda
insigne est: cætera omnia sunt quadrata.
Ipse mons Saxonicus præceps est ex o-
mni

in ni parte, præter eam qua ascenditur. in cuius planicie excelsus collis clementer affurgit, qui qua parte planiciem spectat fossa satis alta & lata circumdatur. ex huius collis saxo arenario, nonnihil rubro, exciso formata est arx illa, cui multæ & magnæ fenestræ. quin in pede ipsius montis cellæ sunt subterraneæ cum equorum item stabulis. Vtræq; arx hoc enigma peperit usitatum Saxonibus & Toringis,

Dic quibus in terris arx alto condita monte

Mille ubi per tectum possunt errare balantes.

Hoensteini etiam, quæ arx est Misenæ trans Albim, equorū stabula in saxo incisa sunt. Et Prenestinæ fossæ subterraneæ literis celebrantur, in quarum una Caius Marius obsessus extinctusq; occidit. Græcas quoq; mulieres, quæ meretricium quæstum faciebant publice, in cellulis subterraneis habitasse ex comicorum scriptis apparet: à quibus χαμα-
τυπῶν nominantur. Et ganeū ἀπὸ γῆς, quod esset in terra, dictum putat Terentij interpretes. Tales etiam cellæ Romæ
b a fuerunt

fuerunt, & frequētiore quidem sub circo maximo, qua pertinet ad naumachiam, & in uico Suburano, & Summæniæ atq; Thufco. In maritimis quoq; Germaniæ quibusdā urbibus, sicut in Prussis Dantisci, & in Saxonibus Lubeci, bonæ uulgi pars sub terra habitat in testudinibus, super quas exstructæ sunt magnificæ domus, quæ à dominis incoluntur. Eodem modo cuniculus, uulpes, lutra, meles, & fortassis aliæ quædam bestię subeunt cauernas, sed egrediūtur ad pastum capescendum etiā hyberno tempore. Ac cuniculus quidem multos fodit specus, & in colles terrenos agit cuniculos: ex qua re nomen inuenit. Mane & uesperī egreditur, reliquo tempore ferē latet. Aliquos autē specus operit puluere, ne deprehendātur. Sed eum uiuerra atque parui quidam canes, quibus est ad inuestigandum sagacitas narium, in specus & cuniculos immissi, aut liquor feruens in eosdem infusus, fugatum & exturbatum pellunt in retia, quibus capitur. Cuniculis autem non unus est color: uel enim in cinereo fuscus, uel lepori

ri non nihil similis, uel maculosus: quo modo candidi nigris uel rutilis maculis stellantur. Vulpes uerò in primis ad fraudem callida, non tam ipsa fodit specus, quàm ab alijs animantibus effossos occupat. Et melem à specu prærepto, quia eius os stercorebus inquinat, foetore abigit. Venatur lepores, cuniculos, mures, gallinas, aues, pisciculos. Dolose autem agit omnia. Etenim sæpe lepores & cuniculos, dum simulat se cum eis colludere uelle, capit incautos: muribus, ut feles, insidiari solet. gallinas noctu, clam ingressa in casas,prehendit & asportat. aues, dum insidiosè se fingit mortuam, ad ipsam aduolantes, captas necat & deuorat. Cauda, quã huic animali magnam & uillis densam natura donauit, à ripis in flumen demissa, pisciculos in eam innatantes capit: & cum paululum de ripa se subduxerit, illam conquassans pisciculos captos excutit in terram ac deuorat. Retrorsum etiam gradiẽdo ad nidulum uespæ accedit, quòd sibi ab earum aculeis metuat: ac cauda in nidulum immissa, uespas excipit. mox his ipsis refer-

b 3 tam

tam extrahens proximo lapidi, uel arbori, uel parieti, uel maceræ illidit. omnibusq; uespis isto modo oppressis & interfectis nidulum uastat atque exinanit. Eadem cauda canem, cum eam insectatur, hac & illac per ipsius rictum ducta, eludit. Ater inaceum, quod ob metum se in globum concludat, ut se spinis undique possit defendere, permingit, & eum suffocat. Etenim propter urinam in ipsius os influentem spiritum ducendi nullam habet potestatem. Ea uero uulpis, quæ canis mediocris magnitudo est. Color autem sæpe rutilus, priori tamen parte canescens: raro candidus, rarius niger. Fiber etiam & lutra egrediuntur ex riparum cauernis, in quibus latet, & se in fluminibus mergunt, ac pisces capiunt quibus uescuntur. sed fructus quoq; & cortices arborum comedunt. Lutra autem à lutando appellatur. Frequenter enim se lauat cum capiendi piscis causa se in aquas, imò sæpe in earum profundum, penitus immergit. Corpus ei latius & longius se, pedes breues, dentes acuti. à fibro cauda, posterioribus pedibus, pilis

his differt. Nam lutra caudam habet longam & reliquarum quadrupedum similem: fiber piscis. Squamis enim obducta, admodum pingue, latam ferè palmum, longam dodrantem. Is si iacet in gradibus, caudam et posteriores pedes demittit in flumen cum frigoribus cōglaciatis: si natat, cauda mota quasi remigare solet. Lutrae autem pedes omnes caninis sunt similes: fibri priores caninis, posteriores anserinis. Etenim membranae quaedam digitis sunt interiectae. itaque hi ad natandū, illi ad eundū magis nati aptique. nam in aqua & in terra uiuit. Fibri uerò pilus est in cinereo cādidus et inequalis: ubique enim à breuib. duplo lōgiore existunt. sed lutra fuscus nonnihil ad castaneae colorem deflectit & breuis ac equalis est; utriusque uerò nitidus, & mollis. quare utriusque pellibus concisis fimbrias uestium ex pellibus nobilibus confectarū, solent exornare: quanquam lutrae pelles longè praestant fibri pellibus. Fiber autem in primis prouidus est & solers. etenim fruticibus & arbusculis dente, tanquam ferro, resectis ante riparum cauer

b 4 nas

nas cōstruit paruas quasdam casas, & in
 ijs duos trēsue gradus, quasi quasdā ca-
 meras: ut cum aqua fluminis crescens in-
 undauerit ripas, ascendere possit: cum
 decrescens, descendere. Atq; etiam cum
 arborem iam ferè secuit, quoties ictum
 facit, toties suspiciēs considerat num sit
 casura. Timet enim ne, si eo ictu conci-
 dat, ab ea, priusquam recedere de loco
 possit, incautus opprimatur. Nec uerò
 minus est constans in proposito quàm
 solers. nam quam arborem ad ripas pri-
 mo elegit secandam, eam non mutat, e-
 tiam si longo temporis spacio dissecare
 non possit. Hoc animal uenamur nō mo-
 do propter caudam qua uescimur, & pel-
 lem qua uestimur, sed etiam propter te-
 stes, quibus ut medicamentis, utimur.
 Eos castorea medici nominant. Fibrum
 enim Græci uocant *καστέρα*. At me-
 les exit è cauernis & uagat in syluis non
 aliter atq; lupus, lupus ceruarius, lepus,
 aper, ceruus, tragelaphus, tarandus, alce,
 platyceros, caprea, ibex, rupicapra, da-
 ma, & aliæ plures. Verum he animantes
 in syluis cubant: posteriores tamen in al-
 tissimis

tissimis montium faxis & rupibus. Melles autē auide appetit mel, ex quo nomē hoc duxit. Magnitudine est vulpis aut canis mediocris, cuius quodāmodo speciem præ se fert, maxime caninus. Nam eius duo sunt genera. Vnum canis instar digitatum, quod caninum uocant: alterum ungulas, ut lues, habet bisulcas, quod idcirco suillum appellant. Omnibus autē melibus crura sunt breuia, dorsum latum, cutis spissa, cuius in metu sufflatæ distētu, utor Plinij uerbis, ictus hominum, & morsus canum arcent: quamquam, si quando cum hisdem pugnant, ualde mordent. Duris uestiuntur uillis, qui sunt uel albi uel nigri, & dorsum quidem abundat nigris, reliquum corpus albis, excepto capite, quod alternis quibusdam quasi lineis nigris & candidis à suprema capitis parte ad rictum ductis decoratur. Crassi autem meles non sunt, pingues tamen: quæ eorum pinguitudo inuncta, uel cū alijs infusa, renum dolores sedat. Ex huius animalis pelle collaria fiunt, quæ ex eo melia à Varro ne nominantur. In ripis etiā fluminum

b 5 &

et lacuū nidos fingūt halcyones. nec **Aristoteli** latuit eas in fluuios ascēdere, sed hyeme nō occultant. Auis est nō multo maior passere. Cū autē marinæ halcyonis corpus totū colorib. cæruleo, uiridi, sub-purpureo, sed mistis insigne sit, adeo ut neq; collū, nec alę aliquo ex eis careāt, et rostrū habeat subuiride, longū, tenue: fluuiatilis seu ripariæ pectus purpureū est, collū & dorsum in uiridi cæruleū, alę fusca, rostrū, ut etiā pedes, cinereū. Vescit pisciculis & uermibus. Lagopus quoq; in altissimarū Alpīū specub. iuxta glaciē, quæ tota nuncq; æstate solis calore calefacta, uel alijs etiā anni tēporib. imbre dilapsa diffundit, nidos cōstruit & cubat. Ex pedibus, quos habet leporis instar uillis & quidē candidis, non plumis, uestitos, nomen traxit. Ei magnitudo columbæ. Color hyeme candidus, æstate in candido cinereus. Longe non uolat, sed Alpibus se tenet. Capta non uiuit, nedū mansuescit. Caro huius auis sano palato est bona, ægroto salutaris. At aues, quibus oculi diurno spacio sunt hebetes, acres acutiq; nocturno, interdū latere, noctu

EX

ex latebris euolare, & ad pastum solent accedere: quas idcirco nocturnas appellant. quales sunt uespertilio, bubo, ulula, noctua, nycticorax. Verum hæ non solum in tenebricosis mōtium & rupium cauernis latent, sed etiam in cauis arboribus, in edificijs desertis, sub tectis domorum magnificarum & templorum & turrium, quæ raro homines succedunt. Vespertilio autem uenatur culices & muscas, exedit pernas, aliasq; carnes suillas de trabibus suspensas. Cæteræ aues nocturnæ prosequuntur mures, hirundines, aues, scarabeos, apes, uespas, crabrones. Sed bubo etiam capit lepusculos & cuniculos. Ea omnium nocturnarum auium maxima ex sono, imò uerò gemitur, quem edit, mihi uidetur nomen inuenisse. Caput habet magnum corpus anseris magnitudine, breue tamen & quasi decurtatum ac colore narium: rostrum curuum, ungues adfucos, oculos grandes. Huic non multum dissimilis est ulula, sed minor: quæ item ex ululanti uoce nomen hoc traxit.

Cum his duabus cognationem habet
noctuæ

noctuae, sed differunt uoce. Nec enim ululant, uerum edunt sonum, quem Aristophanes *λυγυλαῖν* nominauit. Earum quatuor sunt genera. Vnum, cui pluma aurium modo eminet: quod maximum est, & alio uocatur. Alterum eximij candoris in gutture & uentre, alioqui candidis et luteis maculis alternis distinctum. Tertium paruum, quo, ut etiam sequenti, aucupes uenantur aues. Quartum minus illo: quod in rupibus saxisque uersat. Hoc, sicut & proximum, cinereis & candidis maculis uariat, item alternis.

Nycticorax autem, hoc est coruus nocturnus, niger est, ut alterius generis coruus, sed eo plerumque minor. At *uesperilio*, quæ ex uespere, quo euolat, nomen hoc duxit, muri nonnihil similis est, quare scite scripsit Varro: factus sum uesperilio, neque in muribus plane, neque in uolueribus sum. Alas enim habet & uolat, quod ei non conuenit cum muribus: sed animalia parit, non oua, in qua re cum uolucrum naturam non congruit, & foetus uberibus admotos lacte nutrit, cum uolutes cibos conquirant undique, quos in

os

os pullorū inferant. Præterea sunt ei dentes, quibus carent uolucres. Caput autem simile habet muri uel cani : aures plerunq; duas, raro quatuor: dentes feratos : corpus obscure fuluis pilis uestitum, rostrum tamen nigrum, item aures alas duas, quæ ut draconis & piscis uolantis, non ex plumis constant, sed ex membranis, & quidem nigris. In utraq; uerò ala habet digitum, cui est unguis. caudam latam, & sicut alas membranceam, in qua duos pedes, quorum uterq; quinos habet digitos uncis unguibus armatos, quibus in parietibus & rimis cauernarum adhærescit. Aut enim pendet, aut uolat, aut iacet. Quia uerò pedes non oriuntur ex corpore, sed ex cauda, ei esse traditur coxendix una. Vocem acutam ut mus nō emittit, uerū ferè ut catellus latrat. Geminos autem, ut Plinius, uolitat amplexa infantes, secumq; deportat. Cauda & alis affixa dies aliquot uiuit. Quinetiam Troglodytæ, qui in Africa habitant interdium, maxime uerò meridie latent in suis specubus.

De primi generis animantibus, quæ noctu

noctu uel interdiu in terræ cauernis delitescunt dormiuntue satis . Ab eo ad secundum generis animantes, quæ certo anni tempore, ut dixi, subterraneas cauernas succedunt, & in eis graui somno pressæ menses aliquot, quasi mortuæ sine cibo consumunt, ac usq; ad finē eū latent, dum tepore ueris humo excitatæ reuiuiscunt, & reminiscuntur cibum, quem tanto tempore oblitæ erant sumere. Tamen si ex his de quibus iam dixi, aliqua sunt etiam, ut omnis generis quædam bestię sunt, in harum numero, ut suo loco dicā. sed terrenas hic quoq; primò persequar.

Itaq; multæ quadrupedes hyemis aut æstatis tempore se in specus condunt. Etenim mures Alpini autumnō subeunt cauernas, in quibus æstate cubare consueuerunt. Nam in eis ex fœno, stramentis, sarmentis exstruunt cubilia, in quibus totam hyemem usq; ad uer erinaceorum instar cōuoluti delitescunt & dormiunt. In una cauerna plerunq; septem, aut nouem, aut undecim, aut tredecim. Mira uerò eis machinatio & solertia cū fœnū ac reliqua iam congererūt. Vnus enim

enim humi stratus erectis pedibus omnibus iacet in dorso, in quem, tanquam in plaustrum quoddam, cæteri ea quæ congesserunt, conijciunt, & sic onustum, cauda mordicus apprehensa, in specum trahunt, & quasi quodam modo inuehunt, ex quo euenit, ut per id temporis detrito dorso esse uideatur. Itaque posteaquam cubilia in specu strauerint, ipsum aditum atque os eius sarmētis & terra obstruunt & obturant, ut tuti à uentorum uī, ab imbris, à frigore esse possint. Tam autem arcte et grauiter dormiunt, ut effossi & extracti non excitentur antequam in sole expositi uel ad ignem locati concaluerint. Hic mus cognomen ex Alpibus in quibus nascitur, traxit. color ei est aut fuscus, aut cinereus, aut rutilus; magnitudo fere leporis: muris species ac figura, ex qua mus dicitur. Attamen mutilas habet aures & quasi decurtatas: priores dentes longos & acutos: caudā amplius duos palmos longā, pedes breues & uillis superius refertos: digitos pedum ursinis similes: ungues longos, quibus alte effodit terram: posterioribus pedibus

dibus non secus ac ursus ire solet, ac interdum ingredi bipes. Si cibus huic animati datur, eum in priores pedes sumit, ut glis: ut idem glis & simia erectus usque eo in clunibus residet quoad ipsam comederit. Vescitur non modo fructibus, sed etiam pane, carne, piscibus, iure, pulmento: cupide uero lacte, butyro, caseo. quæ cum mandit oris suctu sonitum sic uti porcellus edit. Multum dormit, at etiam uigilat, semper aliquid agit, stramina, forum, rallas, linteola cubili suo importans, quibus os ita complet, ut nihil amplius capere possit. reliquum pedibus accipit & trahit. Cum irritatus exarserit iracundia, acriter mordet. Si quando inter se colludunt mures Alpini, ut catelli clamorem faciunt. Cum e cauerna montiuagi egrediuntur ad pastum, ex eis unus aliquis remanet iuxta illius aditum, quam potest diligentissime & longissime prospiciens. Is cum uel hominem, uel armatum, uel feram uiderit, sine mora clamat. quo audito undique omnes ad cauernam concurrunt. Eorum autem uox fistulae acutæ & lardæis aures similis est. qua & mutationem.

tationem aeris significāt, & sibi quid aduersi accidere. Dorsum ualde pingue habent, quum ceteræ corporis partes sint macræ. quanquam hæc uere nec pinguitudo nec caro dici potest: sed, ut mammillarū caro in bubus, inter eas est medium quiddam. Illud ipsum utile est puerperis, & his quæ ex utero laborant. quibus etiam earum prodest pinguitudo. Vigiliæ præterea tollit. Glīres etiam hyeme nō solum in cauis arboribus, de quare supra dixi, sed in terræ latēt specubus. Glīrem autem Aristoteles ἐλαδρὺ ἀuertendo nominat. Vertit enim & sursum uersus inflectit caudam. qua de causa alij Græci καμψίουρον uocarunt: aliqui uerὸ σκίουρον, quòd cauda sua uillis uestita & conferta, quasi flabello corpus soleat inumbrare: aliqui μῦν σκίτρον, quòd præterea similitudinem quandam gerat speciemq; muris. sicut etiam glis Fennicus, qui non cauda, non figura & liniamenti totius corporis, nō magnitudine, nō moribus, sed solo colore differt à nostra te glire. nam in cādido cinereus est, cum glis nostras sit aut rutilus, aut niger. attamen

c

men

men in ea Sarmatiæ parte, quam hodie Poloniam uocamus, inuenitur cui rutilus color mistus cinereo. Vtrique autem gliri, hoc est tam Fennico quam nostrati, duo inferiores dentes sunt longi. uterque cum graditur, demissam caudam trahit: quum uescitur, cibum in priores pedes, quibus ut mures utitur pro manibus, sumit: posterioribus & clunibus insistit. uescitur uerò faginis glandibus, castaneis, nucibus auellanis, pomis, & similibus fructibus. Vtrique cum hyberno tempore latet, pro cibo somnus. atque per id temporis pinguescunt. Quare recte de glire scripsit Martialis,

Tota mihi dormitur hyems, & pinguior illo

Tempore sum, quo me nil nisi somnus alit.

Eius autem caro dulcis. Etsi uerò glires uiuunt in syluis, ut non immerito de eorum penuria in Fundanio uel de admirandis Varro his uerbis conqueratur, Glis nullus est in sylua mea: tamen ueteres gliraria habebant. Quæ qualia debent esse, idem Varro libro tertio *Dere rustica*

rustica tradidit. Et hodie in quibusdam locis syluestribus incolę fodiunt tellurę, ut in eius cauernis glires inhabitare, & quando uelint eos capere, & in cibo uti possint. Apud Romanos uerò gliribus uiuaria in dolijs Fuluius Hirpinus instituit, ut Plinius scriptum reliquit.

Mus autem Ponticus, quem hodie uocant Hermelam, hyeme solum in cauis latet arboribus, ut suprà dixi. Est uerò totus niuis instar candidus, excepta cauda digitum longa. eius enim dimidia pars, & quidem superior, nigerrima. Huic autem manti magnitudo gliris. Persequitur mures & aues quibus uescitur. Eius pelles in preciosarum numero habēt: ut etiam muris quem Lassiciū uocāt. is in cinereo cādīdus est, nec duobus digitis crassior. At mus Noricus, quē Citellum appellant, in terrę cauernis habitat. Et corpus ut mustelę domesticę, longum & tenue: cauda admodum breuis: color pilis, ut cuniculorum quorundam pilis, cinereus, sed dilutior. Sicut talpa caret auribus, sed non caret foraminibus, quibus sonum ut auis recipit. Dentes habet

muris dentium similes. Ex huius etiam pellibus, quanquam non sunt preciosæ, uestes solent confici. Subit etiam terræ cauernas mus Pannonicus, cui color subuiridis, species mustelæ, magnitudo muris. Sorices quoq; quibus sunt aures pilosæ, hybernis mensib. se condunt in terra excauata. Mus etiam syluestris non tam in arboribus latet, quas ut glis & mus Ponticus scādit, quàm in terra, in cuius cauernas congerit fructus: in primis uerò nuces auellanas, & eas quidem optimas. Quare apud Germanos ex corilo nomen inuenit: nam ei nō pro cibo somnus, sed prouisum pabulū. magnitudine corporis nō differt à glire, uerum colore, qui ei fuscus: & cauda, quam non habet uillis confertam & plenam, sed ab eis nudam, ut cæteri mures.

Mus autem araneus ueluti reliqui mures domestici, non latet in terra, tametsi in ualle Ioachimica ex proximis domicilijs in cuniculos ingrediat, & in his uersetur. Alioqui hyberno etiā tempore in domibus nostris solēt uagari. qui ex eo, sicut mihi uidetur, est nominatus, quod
muri

muri similis sit: nempe pilis subnigris, capite longiusculo, cauda procera, tenui, nuda pilis: & quod ut araneus parietes scandat. Eum Græci uocant *μυγάλλω*. Etenim speciem, ut dixi, gerit muris, & mole corporis mustelæ magnitudinem assequitur & exæquat. Eius morsus plerumque est pestifer: sed ipse diuulsus aut dissectus & uulneri impositus proprio ueneno medetur. At in terra latent aliquot mustelarum genera: nam plura sunt. est enim mustela domestica, quam Græci *γαλλω*, Germani ex sono quem edit, uisellam nominant. Ea plerumque est in dorso & lateribus rutila, raro subfulua: in gutture semper candida. quin nonnunquam tota candida reperitur, quanquam rarius. Corpus habet tenue, & in longius ductum: caudam breuem, primores dentes breues, non sicuti mus, longos. Catulos nuper natos, quia ab hominibus & non nullis alijs animantibus eis periculum metuit, singulis diebus alio transfert. Persequitur mures, depugnat cum serpentibus, sed ut a ueneno tuta sit prius edit rutam. Vbera uaccarum mordet, quæ quàm

primū in tumore fuerint, mustelina pelle perfricata sanant. hec mustela si nostre domi uiuit, etsi habet suas cauernas, non diu ac multū se cōdit: si ruri, hyberno tēpore in specub. latet. Secundū mustelarū genus Germani iltis nomināt ex Græco uocabulo *ἰλῆς*, quo erudita illa gēs appellat syluestre mustelā. id uero habitat in riparū cauernis, ubi lutræ & fibri more pisces captos comedit: & uersat in syluis, ubiprehendit aues: in domibus, ubi gallinas: quare Plinius eam esse domesticam dicit: quarum sanguinē exugit, sed ne clamare possint, earum capita primo mordicus aufert. Atque etiam earundem oua, quæ furari solet, ac multa in unum congerere, exorbet. Aliquanto maior est mustela domestica, minor ea syluestri, quæ martes uocatur. pilos habet inæquales & non unius coloris. Etenim breues subfului sunt: longi, nigri, qui sic ex multis corporis partibus eminent, ut distinctæ nigris maculis esse uideant. attamen circa os est candida, cum grauitexarserit, male olet. Quocirca nostri uilissimū quodq; scortum, & maxime

xime foetidum, pellem ictidos solent nominare. Tertium mustelæ genus etiam sylvestre, in saxorum rimis & cauer-
nis cubat, quod à Martiale martes, à Ger-
manis martarus nominatur. Martialis
uersus hic est in libro decimo Epigram.
ad Maternum,

Venator capta marte superbus adest.
Ei magnitudo felis, sed paulo lōgior est.
crura uerò habet breuiora, itemq̃ breui-
ores ungues. Totum eius corpus pilis in
fuluo subnigris uestitur, excepto guttu-
re, quod candidum est. Hæc mustela, si-
militer atq̃ proxima, ingreditur domos
& necat gallinas, earumq̃ sanguinẽ exu-
git, & oua exorbet. Quartum muste-
læ genus item sylvestre, in arboribus uitã
uiuít, quod etiam uocabulo martis ap-
pellatur. Ea mustela syluas insolenter &
raro deserit: atque in hoc differt à proxi-
ma superiore mustela: & insuper quod
guttur eius lutei sit coloris, & quod reli-
qui corporis pilus magis sit obscure ful-
uus. Huius duo genera quidam esse cèn-
sent: unum quod in fageis syluis uersat̃:
alterum quod in abiegnis, atque id sanẽ

est aspectu pulchrius. Quintum mustelarum genus omniū pulcherrimū & nobilissimum est, quod Germani zobelam uocant; in syluis, ut martes de qua iā dixi, degit, ea paulo minor, tota tamē obscure fulua, præter guttur, quod habet cinereum. Mustelæ horū trium generum bonitate cæteris omnibus eo magis præstant, quo plures pili candidi cum fuluis permisti fuerint. Zobelinæ autem pelles præcij maioris sunt quàm panni auro texti. Etenim comperi optimas quadraginta numero, tot enim uno fasciculo colligari & unā uendi solent, plus quàm milibus nummūm aureorum uenisse. Omne autem mustelarum genus ira incitatū graue quiddam olet, sed maxime id quod Germani iltis appellant, omnis præterea mustelæ stercus aliquantum redolet muscum. Noerza autē, quæ item in syluis uersatur, magnitudine est martis; pilos uero habet æquales, & breues, atq; colore ferè similes lutræ pilis: sed noerzæ pelles longè lutræ pelibus antecellunt, atq; hæ etiam præstant si pili candidi cum reliquis fuerint misti.

Reperi

Reperitur hoc animal in uastis & densis syluis quæ sunt inter Sueuum & Vistulam. Etsi uero mustelæ omnes nec hybernis latent mensibus, neq; subeunt terram, tamen earum formas expressi singulas, quod id, ut arbitror, rerum naturalium studiosis utile sit futurum. At uierra quæ cuniculos ex specubus exturbat, paulo maior est mustela domestica. Color ei in albo buxeus. Audax hoc animal & truculentum, ac omni ferè animantium generi infensum atq; inimicum natura, sanguinem earum quas momorderit ebibit, carnem non ferè comedit.

Istius generis est etiam hamester, quem quidam Cricetum nominant. Etenim existit iracundus & mordax adeo ut si eum eques incaute persequatur, soleat prosilire, & os equi appetere: & si prehenderit, mordicus tenere. In terræ cauernis habitat, non aliter atq; cuniculus, sed angustis: & idcirco pellis, qua parte utrinque coxam tegit, à pilis est nuda. Maior paulo q̃ domestica mustela existit. pedes habet admodum breues. Pilis in dorso color est ferè leporis: in uentre niger, in la-

c 5 teribus

teribus, rutilus. Sed utrunq; latus maculis albis, tribus numero distinguitur. Suprema capitis pars, ut etiam ceruix, eundem, quem dorsum, habet colorem. tempora rutila sunt, guttur est candidum: caudæ quæ palmum longa est, similiter leporis color. Pili autem sic inhærent cuti, ut ex ea difficulter euelli possint. Ac cutis quidem facilius à carne auellitur quàm pili ex cute radicibus extrahantur. Atq; ob hanc causam & uarietatem pelles eius sunt preciosæ. Multa frumenti grana in specû congerit, & utrinq; dentibus mandit. Quare nostri hominem uoracem huius animantis nomine appellât. Ager Turingiæ eorû animalium plenus ob copiam et bonitatem frumenti. Viuerre minor est uormela, & magis uaria. Etenim præter uentrē, qui itē niger est, totum corpus albis, subluteis, rutilis, obscure fuluis maculis decorat. Cauda etiā, quæ longa sesquipalmū, habet pilos cinereos cū candidis permixtos, sed extrema parte nigros. Hactenus dixi de murium & mustellarum ac cognatorum animalium generibus, quorum maxima pars succedit ea

uer

uernas subterraneas : nunc de histrice dicam, qui item in specus secedit, sed æstiuis mensibus. idq; facit contra morem cæterarum animantiũ. Eum Græci quidã ἀκυνθόχοιρον uocant, quòd & similitudinem gerat speciemq; porci bimestris, & spinis erinacei instar hirsutus sit : attamen caput habet leporino similius : aures humanis, pedes ursinis. Iuba ei est superiori parte erecta & priori caua, tubercula cutis, quæ ex utraq; oris parte sunt, setas longas & nigras continent ex eis natas, quin reliquæ etiam setæ sunt nigrae. Primæ spinæ à medio oriuntur dorso & à lateribus, sed lōgissimæ à superiore eorum parte. Quæ singulæ partim nigrae, partim candidæ sunt : longæ duos uel tres uel quatuor palmos. quas, si quando libitum fuerit, ut pavo caudam erigit. Ingressurus in caueā demittit. irritatus iracundia cum cutem intendit, missiles in ora urgentium canum insigit, aut tãto impetu iaculat ut in ligno figat. Dentes ut lepus quatuor habet longos, duos superiori parte, & duos inferiori. Noctu uigilat, interdiu dormit. Vescit pane com-
minuto

44 DE ANIMANTIBVS

minuto, pomis, piris, rapis, pastinacis. bibit aquam, sed cupide uinum dilutum. Hoc animal gignit India et Africa, unde ad nos nuper allatum est. Vrsi præter ea se hyemis tēpore in specuū latebras, quas locus ipsis suppeditat, conijciunt. quòd si nullas suppeditet, eas priorib. pedibus pro manib. usi, faciūt ex ramis & fruticibus cōgestis et ita constructis ut non recipiant imbres. in quæ latibula supini irrepunt. Timent enim de suis uestigijs, quòd in solo impressa eos uenatoribus prodant. Mares autem quadraginta dies, foeminae quatuor menses se occultant latebris: quo tempore candidam in formamq; carnem & pariunt & lambentes sensim in propriam formāt figuram. quod nō ignorauit Ouidius qui canit:

Nec catulus partu, quem reddidit ut
sa recenti,

Sed male uiua caro est. lambendo
mater in artus

Fingit, & in formam, quantam capit
ipsa, reducit.

Abditi primum iacent & arctius dormiunt ad dies quatuordecim, multūq; tam graui

gravi somno fiunt pingues. deinde resistent & priores pedes fugētes uitam ducunt. Ex latibulis uerò rursus prodeunt uere: mares ualde pingues, foemine non item, q̄ pepererint eo tēpore. aluū astrictā solunt aro herba deuorata, Et si uerò ursi sunt auidissimi cædis, tamen ursæ in homines si prostrauerint se, & os ad terram uerterint, ac aerem spiritu nō duxerint, nullam adhibēt fæuitiam: sed eos tantummodo odorantes, tanquam mortuos, quos odisse existimant, relinquūt. ursi autem hominibus nostris noti sunt: multos em̄ regiones frigida gignūt, & quidem fuscas aut nigros. quorum duo sunt genera, magni & parui. hi facilius arbores scandunt, & in tantam magnitudinem, in quantam illi, nunquam crescūt. Vtriq; comedunt carnes, mel, fructus arborum, herbas. Mysia uerò albos urso gignit, qui pisces, ut lutra & fiber, capiunt. Latet etiā in terra hybernis mensibus lacerta: quanquam fuerunt qui negarent eam semestrem uitam excedere. reliquis autem anni temporibus plerūq; in rubetis & spinetis solet uersari. ei quadr

drupedi lingua bifida et pilosa: pedes humiles: uerno tēpore uiridis color, æstiuo nonnihil pallidus. Latet lacerta Chalcidica, ex ærei coloris lineis, quib. tergū eius distinguit, nominata. Eadē seps uocat, q̃ uulnus, si quē momorderit, putrescat, & sanie male olēte soleat manare. à lacerta uiridi nō corporis figura differt, sed colore tantū. Latet lacerta aquatilis, cuius uita est in aqua & in terra, sed crebrius in aqua. Gignit in lacunis opacis, quę in pingui solo sunt, & in quibusdam moeniorū fossis. Parua est, & hāc præter ea habet ab alijs lacertis in colore dissimilitudinē, quòd ipsa uel cinerea sit, uel in cinereo fusca. Testudinis aut salamādræ instar tardius ingredit̃. Irritata si exarferit elata, & quodam modo inflata, rectis pedibus insistit & terribilis oris hiatus acriter oculis intuetur eum à quo fuerit la-
cessita: manatq; sensim lacteo & uiroso sudore usq; dum tota fiat candida. Imposita salī caudam mouet ac effugere conatur. nam eum quia ualde mordet, nō potest ferre, statimq; moritur: cum alioqui uerberata diu uiuat. Latet chamæleon

leon, in India & Africa natus: cuius, ut Aristoteles scribit, corpus in lacertæ figuram est formatum. Eius uerò, ut piscium, & latera deorsum ducta & directæ cum uentre iunguntur, & spina lateribus imminet. Facies simillima simiæ, quam Gebum uocant. Cauda prælonga, quæ in tenue desinit, & lori modo permultis implicatur orbibus. Quum steterit altius quàm lacerta abscedit à terra. Crura nō aliter ac lacerta inflectit. singuli eius pedes diuisi sunt in binas partes. quæ talem inter se habēt situm, qualem pollex ad reliquam manus partem ei oppositā. Quin etiam hæ ipsæ partes singulæ paululum in digitos quosdam diuisæ sunt: priorum quidem pedum interiores tripartito, exteriores bipartito: posteriorū uerò interiores bipartito, exteriores tripartito. Digiti præterea unguiculos habent similes unguibus animantium, quibus sunt adunci. Totum corpus crocodili instar asperum. Oculi in recessu cauo positi prægrandes, rotundi, obducti cute simili reliqui corporis cuti. in quorum medio exigua relicta est regio, qua uidet

det: eam nunquam cute operit. Oculum uersat in orbem, & aspectum quoquo uersus refert, atque ita quod uult cernit. Mutat colorem inflatus: cum aliàs niger à crocodili colore non multum differat: & ut lacerta, pallidus sit. nigris tamen, ut pardus, maculis est uarius. Fit autem mutatio coloris totius corporis. Nam & oculorum & caudæ color nō aliter ac reliqui corporis mutatur. motus eius, ut testudinis, admodum tardus est. Palescit cum moritur, & uita defuncto idem color insidet. Gulam & asperam arteriam eodem situ cōtinet quo lacerta. Carnem nusquam habet nisi in capite & maxillis, cætera membra carent ea. Exiguæ uerò carūculæ sunt maxillis & caudæ, qua parte corpori est agnata. Sanguinē tantummodo habet in corde, in oculis, in loco cordis superiore, & in uenis hinc ductis: atq; in his quidem perpaucum. Cerebrum paululum supra oculos positum, & cum eis continēs est. Cute autem oculorū exteriore detracta complectit quiddam quod uelut annulus æneus tenuis pellucet. Membranae multæ ac robustæ

bustæ & quæ multo præstant his quæ ceteris sunt, distribuuntur in totū eius corpus. Totus dissectus diu spirat, quòd exiguus admodum motus adhuc in ipsius insit corde. Cum omnes corporis partes contrahit, tum uel maxime costas. Lienē qui conspici possit, nusquam continet. Aura uerò perhibetur alii: unde Ouidius non modo dulcis, sed etiā doctus poeta:

Id quoq; quod uentis animal nutritur
& aura

Protinus assimilat tetigit quoscunq;
colores.

Stellio etiam latet. figura similis est lacer-
tæ, natura chamæleonti. nam rore tātum
uiuit, & præterea araneis & melle. Eum
Nicander ἀσκάλαβον, Aristoteles ἀσκα-
λαβώτιον nominat. Etenim illius tergum
guttis stellarū instar lucentibus pictum:
ex qua re etiam apud Latinos nomē in-
uenit. atq; hoc differt à lacerta. Idem γα-
λιώτης à Græcis uocat. Vt anguis exuit
uere membranam hybernā tanquam
senectutē: eamq; nisi præripiatur deuor-
rat. Quem momorderit stellio stupor op-
primit. In Græcia est uenenatus & pesti-
d fer

fer, in Sicilia innocens. Aduersatur scorpionibus. uitam agit in sepulchris, in cameris, in locis ostiorum & fenestrarum.

Latet præterea hybernis mensibus salamandra. Etenim hoc anno in Februario Snebergi maxima uis salamandarum ex uicinis locis collecta agglomerataque in ultima cuniculi cuiusdam, quondam in Molebergum montem acti, tunc uero instaurati, parte fuit reperta. Et proximo anno in Nouembri salamandra uiua ex fonte finitimæ syluæ per fistulas in hoc oppidum influxit. Pluuiæ autem & subsequens serenitas salamandras excitant ex uenis, fibris commissurisque saxorum. hanc quadrupedem, cui item lacertæ figura, Germani, quia propter crura breuia tarde graditur, Græco nomine μόλυβω appellant. Caput ei magnum, uenter lutei coloris, ut etiã ima caudæ pars: reliquum corpus totum alternis maculis nigris & luteis quasi stellatum distinguitur. Propter frigus ignem, non aliter ac glacies, extinguit: quo modo etiam oua serpentium in ignem camini cõiecta flammam solent extinguere, attamen tam ipsa oua quam

quàm salamandra comburunt. Salamandra autem irritata saniem euomit lacteā. huic animali nec masculinum nec foemīnū genus falso putant esse. Testudo etiam terrestris totam hyemē in terra latet, atq; graui somno pressa tempus sine ullo cibo traducit. Scarabei deniq; rutili, & grylli, qui potissimū noctu strident, aridam fodiunt terrā, ut in eius cauernis cubent æstate: grylli domestici etiam hyeme. Nam scarabei ante autūnum, imò prius intereunt q̃ tota æstas effluerit: grylli agrestes ante hyemem, ut etiam aranei nigri, qui similiter habitant in terræ rimis. At scolopendra in truncis arborum, aut in lignis supra terram locatis, aut in palis terræ infixis, unde nomen inuenit, cum putrescunt & gignitur & uiuit. quibus amotis aut cōmotis egreditur: aliàs plerūq; solet latere. Pennis caret, sed plurimos habet pedes: quocirca eam ex Latinis alij multipedā, alij centipedā, alij millepedam uocarūt. si quādo repit, partem corporis mediam tanquam arcum intēdit. si bacillo aliā uere tangitur, se contrahit. Color ei æneus,

d 2 corpus

corpus tenue, nec ualde latū, longū uerò tres digitos, aut summū quatuor. Iam in uolucris, quę se cōdūt, hirūdines riparię sunt. Eteñ plures numero inter se nexę hybernīs mēlib. latēt in ripis fluminū, lacuū, paludū, & in littorib. ac scopulis maris, unde accidit ut piscatores interdū ita inter se iunctas ex aquis extrahāt. Dictę autem sunt riparię, quòd soleāt ripas excavare, & in eis nidos construere ac latēre. has Græci & ἀποδῆς uocāt, nō quòd sine pedibus sint, sed eorum careant usu: & κυψέλας, quòd oua pariāt & excubēt in cistellis longis, ex luto fictis: quibus aditus sit angustus, ut omni anni tempore belluas & homines uitare, hyeme à frigoribus tutę esse possint. Hoc differunt ab hirundinibus tam agrestib. q̃ domesticis, quòd tibiās habeant hirsutas. Hę, inquit Plinius, sunt quę toto mari cernuntur, nec unquam tam longo naues, tamq̃ cōtinuo cursu recedunt à terra, ut non circumuolitent eas apodes. Cætera genera residunt & insistent, his quies nisi in nido nulla: aut pendent, aut iacent.

Hyeme etiam in cauernis montium,
etli

etſi non in his ſolis, latēt ueſpertiliones, bubones, ululæ, noctuæ, hîrūdines, ſturni, palumbes, turtures, merulæ, turdi, alaudæ, upupæ: de qua re ſuprà dixi.

Iam ex aquatiliū quæ latent genere quædam hyeme, quædam æſtate condūt ſe uel in cœno, uel in arena: & ita quidē ſe in ijs condunt, ut reliquum corpus totum tegatur, os ſit liberū. Hybernīs menſibus hī piſces condunt ſe, primadię, hippūrus, coracinus, murena, orphus, conger, turdus, merula, perca, thynnus, raia & omne genus cartilagineum, cochleæ. Aëſtiuis uerò menſibus condit ſe glaucus, aſellus, aurata. Tricenīs diebus circa canis ortum purpura, buccinum, pectē, delphinus. Iam in numero animantiū quarū uita eſt in terra pariter & in humore latet hyeme lacerta aquatilis, de qua ſuprà dixi. Crocodilus quoq; ſpectū eiūſdē hyemīs uitædæ cauſa ſuccedit, & in eo quatuor latet menſes. Frigus adeo moleſte patitur, ut etiam cum nō ſolet latere, interdū in terra uerſetur, in aqua noctu. Viuis in Europam raro nūc affertur: ſed mortuū ſæpe pharmacopo-

læ in officinis suis de trabe suspendunt. Plinius eius figuram & naturā diligēter est persecutus. quadrupes malū, inquit, & terra pariter ac flumine infestū. Vnū hoc animal terrestre linguæ usu caret: unū superiore mobili maxilla imprimit morsum, aliàs terribile pectinatim stipāte se dentium serie. Magnitudine excedit plerunq; duodeuiginti cubita. Parit oua quanta anseres, eaq; extra eū locum semper incubat prædiuinatione quadā, ad quem summo auctu eo anno egressurus est Nilus. Nec aliud animal ex minori origine in maiorem crescit magnitudinem. Et unguibus hic armatus est, & cōtra omnes ictus cute inuicta. Hunc saturnum cibo pisciū & semper esculento ore in littore somno datum, parua auis, quæ trochilos ibi uocat, rex auium in Italia, inuitat ad hīandum pabuli sui gratia, os primo eius ad sultim repurgās, mox dentes & intus fauces quoq; ad hāc scabendi dulcedinem quā maxime hīantes. in qua uoluptate somno pressum conspīcatus ichneumon, per easdem fauces, ut telum aliquod, immissus erodit alium.

In

In eo maior erat pestis, quàm ut uno esset eius hoste natura contēta. Itaq; & delphini immeantes Nilo, quorum dorso, tanquam ad hunc usum, cultellata inest pinna, abigentes eos præda, ac uelut in suo tantum amne regnātes, alioquin impares uiribus ipsi, astu interimūt. in uentre mollis est tenuisq; cutis crocodilo, ideo se ut territi immergūt delphini, subeuntesq; aluum illa secant spina. Quin et gens hominum est huic belluæ aduersa in ipso Nilo, Tentyritæ ab insula in qua habitat appellata. Mensura eorū parua, sed præsentia animi in hoc tantū usu mira. Terribilis hæc contra fugaces bellua est, fugax contra insequentes. sed aduersum ire soli hi audent. quinetiam fluminis innatant, dorsoq; equitantium modo impositi, hiantibus resupino capite ad morsum, addita in os claua, dextra ac læua tenentes extrema eius utrinq;, ut frenis in terrā agunt captiuos. Ac uoce etiā sola territos cogūt euomere recētia corpora ad sepulturā. itaq; ei uni insulæ crocodili non adnatant, olfactuq; eius generis hominum, ut Psyllorum serpentes, fūd 4 gantur

gantur. hebetes oculos hoc animal dicitur habere in aqua, extra acerrimi uisus. Quidam hoc unum quamdiu uiuat crescere arbitratur, uiuit autē lōgo tempore.

Latent etiam hybernis mēlibus in terra ranæ omnes, exceptis tēporarijs istis minimis, quæ pallent in coeno, & reptāt in uijis & littoribus. Hæ enim quia nō ex semine, quod effundunt. mas & fœmina cum complexu uenereo iunguntur, sed ex puluere æstiujs imbribus madefactio oriri uidētur, diu in uita esse nō possunt. Itaq; cōditur uiridis illa parua, quā Græci & καλαμίτιον uocant, quod in arundinetis agere consueuerit: quanquā etiam arbores scandit, atque in herbis uiuit; & βρέφαντα, quod sono sui generis pluuias futuras prænūciat. Nec enim, ut Plinius à nobis dissentiat, est muta & sine uoce. Verno tempore sæpenumero uidet ex terra eminere media, media adhuc in ea latēre. Conduntur uirides ranæ, quæ uersantur in fluuijs atq; piscinis, & hæ quidem uocales & edules sunt. Conduntur subliuidæ & subcinereæ, quæ item in fluuijs, lacubus, paludibus, lacunis uiuunt.

hæ

Hæ partim uocales & edules sunt, partim
 mutæ & nō eduntur: quas hybernis men-
 sibus in terra latere argumēto est, quod
 uerno tempore non tantum earū foetus
 conspiciātur in lacunis, sed ipsæ ueteres
 etiam ranæ. Quare uerum non est quod
 scribit Plinius: mirumq; semestri uita re-
 soluuntur in limū nullo cernente, & rur-
 sus uernis aquis renascuntur, quæ fuere
 natæ: perinde occulta ratione, cum om-
 nibus annis id eueniat. foetus aut earum
 sunt primo carnes paruæ, rotundæ, nigre,
 dein oculis tantū et cauda insignes: quas
 Nicæder quia caudā mouēt, *μολοειδίας*,
 Aratus quia rotundæ, *γυελύς*, alij Græci
βαβαχίδιας, quasi dicas ranūculos, nomi-
 nant, quorum postea figurantur pedes,
 priores ex pectore, in posteriores findit
 cauda. Conduntur præterea ranæ palli-
 dæ in hortis agentes, quæ nō comedun-
 tur & mutæ sunt. Conditur deniq; rana
 rubeta, quæ ex rubis, sub uepribus enim
 uersari solet, nomen inuenit. eam poeta
 bufonem, Græci *φρυγών* uocāt. Duo eius
 genera, altera terrena, quæ in domibus
 & uepribus agit: altera palustris, quæ sui
 d s gene

generis uocem edit. Vtraq; si bacillo sapius uerberet, inflato corpore uirus primo è clunibus exprimit longius, deinde sudat: cuius sudoris lactei guttæ admodum grauis & putidi sunt odoris: accu occiditur ferè opij; occiditur autem difficulter. Rana rubeta mulieres ueneficæ quondam ad ueneficia sunt usæ. Mus quoq; aquatilis hyeme latet in ripis fluminum & riuorum quos incolit. Ei magnitudo ferè muris syluestris, mordet sæpe manus piscatorum, cum ex foraminibus riparum cancos fluuiatiles extrahunt. Vorat pisciculos paruos, quales sunt gobiones fluuiatiles & alburni: uorat foetus lucij, salaris, barbi, aliorumq;: quocirca ubi magna uis id genus muriu nascit, riuus uastitatẽ solet inferre. Cancer etiã fluuiatilis succedit ripas, & in eis hyeme latet, æstate plerunq; uersatur. Iam deniq; in serpentium genere, qui maxima ex parte terreni sunt, uipera, quam Græci *ἐχιδνῶν*. uocant, hyeme subit saxa. Ea longa est circiter cubitum, & maculis incinereo fuscis plena. Primò intra se oua parit: dein his exclusis uiuas animantes: nec

nec tamē ipsa catulos singulos, ut Nican-
der & Plinius scribūt, diebus singulis pa-
rit uiginti numero: nec cæteræ tarditatis
impatientes perrūpunt latera occisa pa-
rente: sed ut nobis serpentium speculato-
res affirmant, uno eodemq; die catulos
plerumq; undecim, plures interdum pa-
rit: & quidem eis superstes uiuit. Nec ue-
rò etiam cum uiperæ cōmīscēt corpo-
ra sibi circumuolutæ foemina maris ca-
put insertum in os, ut idem Plinius scri-
bit, abrodīt uoluptatis dulcedine. nō au-
tem mas modo, uerū etiam foemina na-
tura breuē & quasi mutilam habet cau-
dam, non ut pleræq; aliæ serpentes lon-
gam: sed differunt inter se. etenim foemi-
næ caput est latum, maris acutum. Cum
hic mordet ac uirus euomit, apparēt ue-
stigia duorum dentium acutorum: cum
illa, plurium. Minori autem uiperæ di-
psas est affimilis: quæ cum alba sit, eius
caudam duæ nigræ distinguunt lineæ: à
se ictū inexplēbili siti enecat, ex quo no-
men hoc duxit. quin ipsa multū sitit. quo
circa immoderato potu onustæ umbili-
cus rumpitur, & grauius onus effundit.
hanc

hanc alij caufonem, alij prefterē uocant. sed prefter ut corporis forma non multum à diplade differat, effectū differt. nā ictum extemplo fideratione quadā reddit immobilem ac mente alienum. mox pilis diffluentibus cum pruritu ac uētris solutione absumit. Condit etiam se in terra, sicuti cæteræ serpētes ferē omnes, uel in saxorum rimis cæcula: ex cæcitate apud Germanos quoq; nominata. quā eadem de causā Nicander *τυφλώπα*, alij *τυφλῖνος* nominant, etenim caret oculis. Color ei in luteo uiridis, & ualde splendens. nuncq; pede est longior, nunquam digito crassior. ea sicut & uipera, ut Columella scriptū reliquit, sæpe cum in pascua bos improuide supercubuit, laceffita onere morsum imprimit. Quin amphibæna hebetes habet oculos. itē parua est & tarda, sed biceps. quare alterutro capite, cum ei libitum fuerit, progredi uel regredi potest. unde ei nomen impositum, densæ cuti color insidet terræ, uarijs notis distinctæ. Huic non dissimilis est figura scytale, sed pinguior. ei crassitudo quæ manubrio ligonis, longitudo

udo quæ lumbrico. hæc cum uerno tem-
 pore exuias posuerit, foeniculo, ut cæte-
 ræ serpentes non uescitur. ex baculo no-
 men inuenit. Tum hybernis mēlibus
in caua terræ uel loca saxosa ingredit̃ nā
trix à natando appellata. qua de causā à
 Græcis ex aqua *ὕδρ* nominat̃: & *χέρ-
 σον*, quòd & in terra & in aqua uer-
 setur. Nec assentior Lucano qui cherfy-
 drum à natrice distinguit. Est autem infe-
 sta & inimica ranis, forma non differt ab
 aspide, sed colore, qui ei plerumq; in cine-
 reo candidus. Ex natricum genere uide-
 tur esse Calabricus serpens, etiam si ma-
 culosus sit. Eum his uersibus describit
 Virgilius:

Est etiam ille Calabris in saltibus an-
 guis,

Squammea conuoluens sublato pe-
 ctore terga,

Atq; notis longam maculosus gran-
 dibus aluū,

Qui dum amnes ulli rumpūtur fon-
 tibus, & dum

Vere madent udo terræ, ac pluvialē
 bus austris

Stagna

Stagna colit, ripisq; habitans hic pī-
scibus atram

Improbis ingluuiem, ranisq; loqua-
cibus explet.

Postquam exhausta palus, terreq; ar-
dore dehiscunt,

Exilit in siccum, & flammātia lumi-
na torquens

Sæuit agris, asperq; siti & exterritus
æstu.

Ex natricum præterea genere sunt boæ,
in tantam, Plinio autore, amplitudinem
exeuntes, ut diuo Claudio principe occi-
sæ in Vaticano solidus in aluo spectatus
sit infans. Alunt primo bubuli lactis su-
ctu, unde nomē traxere. sunt enim nihil
aliud quam domesticæ atque uernaculæ
natrices. Aspis autem est longitudine
quatuor pedū, crassitudine hastæ. Color
non eis unus. nā alijs squalidus, alijs uiri-
dis & uarius, alijs cinereus, alijs igneus:
maxime Aethiopicis. Oculi hebetes in
temporibus & iuxta supercilia caruncu-
læ instar calli eminēt. quocirca quasi so-
mniculosa nictare nō cessat. sed animan-
tium strepitu facile excitat. Gignit eam
Aegy

Aegyptus, Aethiopia, & cæteræ region-
es Africæ. Coniuge, utor Plinij uerbis;
fermè uagantur, nec nisi cum cõpare ui-
ta est. itaq; alterutra interempta, incredi-
bilis alteri ultionis cura. persequit inter-
fectore, unumq; eum in quantolibet po-
puli agmine noticia quadã infestat. per-
rumpit omnes difficultates, permeat spa-
cia, nec nisi amnibus arcetur, aut præce-
leri fuga. Huic ichneumõ, qui similis est
mustelæ domesticæ, quam Græci *ixtidæ*
uocant, maxime inimicus est. itaq; non
tantum eius oua perdit, sed ipsum etiam
interficat. etenim mergit se limo sæpius,
siccaturq; sole. mox ubi pluribus eodẽ mo-
do se corijs loricauit, in dimicationẽ per-
git. in ea caudam attollens ictus irritos
auersus excipit, donec obliquo capite
speculatus inuadat in fauces. aspides au-
tem Galenus in tria distribuit genera, in
chelidonias, cherseas, ptyadas, à sputo
cognominatas: quas Cleopatra sibi ad-
mouit. Aspis uerò frigoris impatiẽs hye-
me inclusus atq; abditus latet in arenis:
ut in cauis fagis aut quercubus dryinos.
ex qua re nomen inuenit. eam aliij, ut Ni-
cander

cander scribit, hydron, alij chelydrō nominant. est enim natrici, quod ad caput attinet, similis, sed tergum habet cinerei coloris. crassitudo & lōgītudo ei est mediocris anguillæ. grauit̃er olet. ranarum fœtus, cauda insignes persequit̃: & eam contra musca magna. At ceraſtes ex cornibus nomen traxit, quæ modo cochleæ instar gemina, modo quadrigemina gestat in capite: & quidem corporea. quorū motu, scribit Plinius, reliquo corpore occultato sollicitat ad se aues. alioqui in uiperæ figuram est formatus. Color ei squalidus. in frigidis tamen regionibus reperit̃ natrici similis figura & colore: quanquam raro in his reperiri soleat. In Africa in arenis & orbitis uersatur: alibi plerunq; in saxorū rimis, in quibus latet hyberno tempore. Aristoteles colubros etiam Thebanos tradit esse cornutos. Hæmorrhœos quoq; in saxorū rimis agit. ea ex profluente sanguine nomen inuenit. nam cum aliquem momorderit prima nocte sanguis erūpit ex auribus, ex naribus, ex ore unā cum spūto, ex uesica cum lotio, ex uulneribus cum sanie

sanie: gingiuarū præterea & caro quæ est sub unguibus, stillant sanguine, si quem hemorrhoids foemina momorderit. est autem longa pedē, non multum crassa. etenim paulatim in tenuē caudam definit, colore aliàs cinereo, aliàs candente. Ex fronte eminent duo cornicula, item corporea. oblique ac tardius serpit, & perinde strepit ac si arundines transeat. Huic figura similis est sepedon, sed corniculis caret, & contrarie serpit. color ei ruber, à putredine, quæ mox sequitur eius morsum, nominatur. Porphyryus uerò, ut Aelianus tradit, palmi est magnitudine, capite candidissimo, reliqua purpureus, morsu innocuus, quippe qui dētibus careat. inuenitur in Indiæ locis uadōsis. captam cauda suspēdunt, uiuētisq; ex ore defluentē liquorē legūt in uasculis æreis. alterum item ex iam defuncto liquorem nigrum similiter in altero uase excipiūt. & hic quidem in esculentis seu poculentis cum grano sesami datus tabe lenta uenit uel etiā duorum annorū spacio paulatim enecat: ille more cicutæ statim absumit. Acontias autē, quem Latini iaculum
e lum

lum appellant, ex arborum ramis se iaculi instar uibrat in animal quod præterierit: ex qua re nomen reperit. nec uerò solum desuper se uibrat in animal, sed humi positus, si fuerit laceffitus, iaculi modo corpus intorquens eminus petit aduersarium. Cenchris uerò, quā Nicanter cēchrinen uocat, ex eo quod crebris maculis milij semini colore similibus, sit interstincta nomen inuenit. de qua Lucanus:

Quam semper recto lapsurus limite
cenchris

Pluribus ille notis uariatam tingitur
alum,

Quam paruis tinctus maculis The-
banus ophites

Concolor exustis atque indiscretus
arenis.

At basiliscus ex eo nominatur, quod ita ueneno cæteris serpentib. præstet, ut rex purpura & insignibus regijs ijs, in quos dominatur, antecellit. Caput ei acutū, & color flauus. Cyrenaica, inquit Plinius, hunc generat provincia, duodecim non amplius digitorū magnitudine, candida
in

in capite macula, ut quodam diademate
 insignem. sibilo omnes fugat serpentes.
 nec flexu multiplici, ut reliquæ, corpus
 impellit, sed celsus & erectus in medio
 incedens, necat frutices: non contactos
 modo, uerum & afflatos. exurit herbas.
 rumpit saxa. talis uis malo est. Creditum
 quondā ex equo occiso hasta, et per eam
 subeūte ui, nō equitē modo, sed equum
 quoq; absumptū. Huic tali monstro sæ-
 pe etenim enectū cōcupiuerē reges ui-
 dere, mustelarū uirus exitio est. adeo na-
 turæ nihil placuit esse sine pari. Inijciunt
 eas cauernis facile cognitīs sola tabe. ne
 cant illæ suo odore moriunturq; & natū-
 ræ pugnam conficiūt. Basiliscum ex uo-
 lucrum, quas Aegyptij uocāt ibes, ouis
 gigni theologus Cassianus affirmat: uul-
 gus ex ouo, quod gallus peperit, mōstro
 se asserit nasci. qualis fuisse perhibetur is
 qui Zuicæ aliq̃t homines necauit suo
 ueneno. qua de causa dominus cellæ in
 qua erat, fores clausit muroq; sepsit.
 Sequitur draco à uidendo appellatus, q̃
 acrius cernat q̃ cæteræ serpētes. quocir-
 ca ueteres eū thesauris custodiendis præ-
 fece

fecerūt: atq; in ipsius custodia ædes, adyta, oracula posuerunt. Est autem ad aspectū pulcher. etenim totus niger, præter uentrem, qui subuiridis, & carnē submento, barbæ speciem præ se ferentem, quæ felle tincta uidetur esse. Pellis utriusque supercilij pinguis. Ipse præterea utrinque triplici dentium ordine decorus: nec tamen multum mordens. Pugnabit in alijs regionibus cum aquila, in Africa & India cum elephante. Nam in his sunt uicenum cubitorū. Duplex eius genus: unum terrenum, quod iam descripsi: alterum uolucris, cui ut uespertilioni membranæ sunt alæ. Id ex uastitate Libyæ uento Africo inuehi in Aegyptum Cicerō scriptum reliquit. Vnum habui longum sesquipedem, quo Ambrosium Fabianum donauī. cui ferè color crocodili fuit, de hoc scribit Lucanus:

Vos quoq; qui cunctis innoxia numina terris

Serpitis aurato nitidi fulgore dracones

Pestiferos ardens facit Africa, ducitis altum

Aera

Aera cum pennis, armentaq; tota sequuti

Rumpitis ingentes amplexi uerberare tauros,

Nec tutus spacio est elephas. datis omnia letho.

Nec uobis opus est ad noxia fata ueneno.

Vt autem ex dictis serpentibus aliqua in calidissimis regionibus nullo anni tempore necesse habent latere, certe in arenis & rimis saxorum solent cubare.

Serpit etiam teredo. caret enim non modo pennis, uerum etiam pedibus. sed ea cui color æneus sub lignis putribus et nascitur & latet, ac plerumq; iuxta scolopendram inueniunt. Crassitudo ipsi est minima pennæ anserinæ, qua utimur cum scribimus: longitudo scolopendræ. sed teres est. Hactenus de animantibus, quæ in terra latent aliquo anni tempore: nunc dicam de subterraneis proprie uereq; sic dictis, hoc est de his quæ intra terram gignuntur, & semper ferè sub terra, quasi defossæ uiuunt. Hæ autem ipsæ partim in terra sicca, partim in humida, uel

In aquis subterraneis uitam agūt. Primi generis sunt talpa, mus, rana uenenata, spondylis, ascarides, lumbrici, cochleæ cauaticæ: alterius, pisces subterranei. quas animâtes singulas persequar: & primò quidem talpam. Ea quadrupes est non multum dissimilis muri, cæcâ tamē. quāquam oculorum effigies, scribit Plinius, inest, si quis prætentam detrahat membranam, quæ non est pilis uestita. si quidò audit etiā obruta, extracta ex terra, quam in aruis, magis uerò in pratis & hortis, passim egerit; diu non potest uiuere. crura habet breuia, quare tarde graditur. digiti, qui in priorib. pedibus sunt quini, in posterioribus quaterni, omnes acutis unguiculis, quibus terram fodit, armantur. pilos aut habet nigrore splendido insignes. qui catulis earum sunt albi. Vescitur ranis, etiam uenenatis, lumbricis, radicibus frugum & herbarum. ex earum pellibus pileoli & cubicularia fiunt stragula. Sequitur mus subterraneus, quem alij agrestem uocāt. Seruius à Cicerone nitedulam putat nominari. De hoc Virgilius:

saepè

sæpe exiguus mus

Sub terris posuitq; domos, atq; hor-
rea fecit,

Aut oculis capti fodere cubilia tal-
pæ,

Inuentusq; cauis bubo, & quæ pluri-
ma terræ

Monstra ferunt.

Non autem multo minor est mure ara-
neo. quin caudam ut ille longam habet
ac crassam. Corrodit, imò exest, planeq;
interdum consumit radices lupuli, pasti-
nacæ, rapæ, & reliquorum leguminum.
Vastat messes: uerum ea pestis non sem-
per in terra latet, sed nonnunquam egre-
ditur, etsi rarius. Contrà rana uenena-
ta, quam metallici nostri ex ignis colore
qui insidet ei, *πυελόφωρον*, suo tamen uo-
cabulo nominant, in saxis perpetuo quæ-
si cōdita & sepulta latet. Altius intra ter-
ram gignitur, & reperit modo in uenis,
fibris, saxorum commissuris, cum hæ ex-
cauātur: modo in saxis ita solidis, ut nul-
la foramina, quæ uideri possint, appare-
ant, cum cuneis diuidūtur. Quo sanè mo-
do & Snebergi & Mannisfeldi fuit in-

uenta. Ea ex subterraneis cauernis elata in lucem primò turget ac inflatur, mox de uita decedit. talis etiam rana crebrius reperitur in Gallijs Tolosæ in saxo arenario rubro, candidis maculis distincto, ex quo molæ fiunt. quocirca id genus saxa omniâ priusquã molas ex eis faciant, perfringunt. quòd ni fecerint ranæ, ubi cum molæ uersantur, concaluerint, inflari solent, & disruptis molis frumenta ueneno inficere. Spondylis autem uermis intra terram reperiri solet ita conuolutus ut uerticilli, quod Græci *σύνδυστρον* uocant, speciem præ se ferat; unde nomē inuenit. Ei longitudo & crassitudo minimi digiti: caput rubrum. sed quia hic uermis caret pedibus, & serpsit, Plinius scribit: genus id serpentis est. edit radices cucumeris asinini, chamæleontis nigri, centaurij, peucedani, aristolochiæ, uitis syluestris: cum aliud animal eas non attingat. Sed uermis quadrupes, qui in Maio natus in agris currit, item crassus & longus minimum digitum, ut pulices terreni, in leguminibus orti, supra terram uiuit. Ei corpus molle, nigror splendidus, gracilis

gracilis isthmus. posterior corporis pars pectori adheret. cum in manus sumitur, eas pingui liquore inficit. pellit urinam, sed unā sanguinem. Ascarides etiam, qui sunt vermes parui, nō unius & eiusdem coloris. nam alij candidi, alij lutei, alij nigri, sæpius aratro excitantur. Reperiuntur autem plures in unum aliquem locum congregati. hi vastāt sata. etenim ualidas segetes radicibus subsecis enecant. At lumbricos, qui item intra terram gignuntur, & oculis carent, pluviae eliciunt. Conceinne igitur Euclio Plautinus, sollicitus de aula auro referta, inquit ad Staphylum:

Foras, foras lumbrice, qui sub terra ereplisti modò,

Qui modò nusquā cōparebas, nunc quom compares peris.

Quin cochleæ in Balearibus insulis, ut Plinius scribit, cauaticæ appellatæ, non prorepunt è cauis terræ, neque herba uiuunt, sed uix modo inter se cohærent.

Abeo nunc ad alterum animantium subterranearum genus, quod in humidis terræ locis agit: etsi lumbrici etiā &

e 5 alix

aliæ quædam id genus animâtes in terra tantū gignuntur humida. Pisces aut fossiles duorum generū inueniūtur, sed intra terram nonnihil teretes ut anguillæ, sed pelle carēt tenaci: squamis etiam, ut & gobij. duramq; nec admodum iucundam gustui habent carnē. maiores crassi sunt ferè duos digitos: minores, digitū. illi lōgi circiter palmos quatuor: hi tres. Sonum edunt acutum. Eos pharmacopolæ in uitrum inclusos de trabe suspendunt, ut spectaculum hominibus præbeant: longoq; tempore alunt pane & alijs quibusdam. Ex fluminibus autem quæ currunt in locis paludinosi egressi per riparum uenas longius penetrant in terram: & interdum in proximi oppidi cellas usq; subterraneas, in quibus uinum uel zythum solet condi. Attamen Theophrastus scribit eos reperiri iuxta fluuios & in aquosis locis. Cum enim terram inundauerit aqua, ex alueis fluminum egredi in eam: cum decreuerit, relinqui in exiccata. Itaq; persequētes humorem terram subire: dein humore exiccato in halitu permanere: non aliter ac pisces in
 ter

ter cæteros salitos uiuunt. In latebris autem propter sensuum stuporem eos nihil sentire, sed effossos se mouere. Non dissimile ait accidere in Ponto his piscibus quos glacies complectitur. Etenim non prius sentiunt & mouentur, quàm in patinam iniecti coquantur. Verum nullos pisces, qui in fluuijs uersari semper soliti fuerunt, post inundationes in locis siccis relictos subire terram uidemus, sed omnes de uita decedere. Itaque cum fossiles pisces etiam in locis, quos non inundauit aqua, soleant inueniri, certum est illos eò per uenas & fibras penetrare. De qua re ultra Albim Orteranti, quod oppidum est ad Polsenicium fluuium, diligenter aduertit. Nec in Germania modo fossiles pisces reperiri solent, sed etiam post Pyrenæos montes, ut Polybius in quarto & trigesimo historiarum libro tradit, usque ad Narbonem amnem planicies est: per quam fluuij feruntur Iberis & Rhodanus fluentes propter urbes eiusdem nominis, quæ habitantur à Celtis. In hac igitur planicie sunt pisces fossiles dicti. In ea enim est terra tenuis &

& multum nascitur gramen. sub quod altitudine duorum uel trium cubitorum per arenam aqua fluminum dilatata fluit. Et si quando inundauerint cum aqua pisces terram subeuntes alimenti causa, nam mirifice appetunt graminis radices, planiciem efficiunt refertam piscibus subterraneis, quos incolæ effodiunt. Inueniuntur etiam fossiles pisces circa Heracleam, & in multis Ponti locis, ut Theophrastus memoriæ prodidit. Quin, si Senecæ credimus, sub terra sunt stagna obsessa tenebris & locis amplis. Animalia quoque illis innascuntur, sed tarda & informia, ut in aere cæco pinguique concepta, & in aquis torpentibus facta. Et, ut idem scribit, in Caria circa Idimum urbem cum exilisset unda, perire quicumque illos ederant pisces, quos ignoto ante eum diem cælo nouus amnis ostendit.

Postremo in subterranearum animantium, seu, quod placet theologis, substantiarum numero haberi possunt demones, qui in quibusdam uersantur fodinis. Eorum autem duplex est genus. Sunt enim truculenti & terribiles aspectu

Et tu, qui plerunque metallicis infesti atq;
inimici sunt. Talis fuit Annebergius il-
le, qui operarios duodecim amplius fla-
tu interfecit in specu, qui corona rosa-
cea appellatur. Flatum uerò emittebat
ex rictu. Equi enim specie habentis pro-
cerum collum & truces oculos dicitur
uifus. Eiusmodi etiam fuit Sæbergius,
nigro cucullo uestitus, qui in fodina Ge-
orgiana operarium è solo sublatum in su-
periori loco maximæ illius concauitatis
quondam feracis argenti collocauit, non
sine corporis attritu. Certe Psellus, cum
sex genera dæmonum definiat numero,
hoc cæteris peius esse dicit: quòd ipsi a-
mictui sit crassior materia. Quidam phi-
losophi hos & similes dæmones, qui no-
centes sunt, & natura improbi, nomi-
nant brutos & rationis expertes.

Sunt deinde mites, quos Germa-
norum alij, ut etiam Græci, uocant Co-
balos, quòd hominum sunt imitatores.
Nam quasi laticia gestientes rident: &
multa uidentur facere, quum prorsus ni-
hil faciant. Alij nominant uirunculos
montanqs, significantes staturam, qua
plerunq;

plerunque sunt: nempe Nani tres do-
drantes longi. Videntur autem esse se-
neciones & uestiti more metallicorum,
id est, uittato indusio, & corio circum
lumbos dependente induti. Hi dam-
num dare non solent metallicis, sed ua-
gantur in puteis & cuniculis: & quum
nihil agant, in omni laborum genere ui-
dentur se exercere. quasi modo fodiant
uenas, modo in uasa infundant id quod
effossum est: modo uersent machinam
tractoriam. Quanquam uerò interdum
glareis lace ssunt operarios, rarissime ta-
men eos lædunt. Nec lædunt unquam,
nisi prius ipsi cachinno fuerint aut ma-
ledicto lace ssiti. Itaque non admodum
dissimiles sunt dæmonibus, tum his qui
raro hominibus apparent, quū quotidie
partē laboris domi perficiant, & curent
iumenta. quibus quod nostri causa be-
nigne faciant, generiq; hominum sint,
aut saltem esse uidentur, amici, nomen
imposuerunt Germani. Gutelos enim
appellant: tū Trullis uocatis. quos sexu
tam mulieris q̃ uiri ementito cum apud
alias nationes, tum maxime apud Sui-
onas

nas in famulatu fuisse ferunt. Sed demones montani potissimum laborāt in his specubus, è quibus metalla effodiuntur iam, uel ea effodi posse spes est. Quocirca metallici non deterrētur à laboribus, sed omen inde capientes alacriori animo sunt, & uehementius laborant.

ANIMANTIVM DE QVIBVS
scribimus nomina, quæ ipsis po
suerunt Germani.

GRADIENTIVM

Alce elch/ elend

Aper Wildschwein

Asellus schefflein. in fenestris uer
satur.

Bετραχιδεσ Eaulkroten

Blattæ Wibel/ brotworme/ spring
wibel

Βειξας laubfrosch

Καλαμίτη item laubfrosch

Καμψιουρ⊙ eichorn

Caprea reh

Ceruus hirs

Chamæleō Germanis est ignotus

Crocodilus crocodil

Cuniculus cunlein

Dama eingempe des hornet vorsich
gebogen sein

Ελαδς eichorn

End

NOMINA

Erinaceus igel, eius duo genera,
huntsigel vnd sewigel

Fiber piber

Formica eime

Γαλα Wisel

Glis eichorn

Glis Fennicus seh/dar von sechberg
vnd schonberg

Γυρίνοι Kaulkroten

Histrix stachel schwein/portcopict

Ibex steinpoet

Ικτίς iltes

Lacerta grunadex

Lacerta Chalcidica Kupferadex

Lacerta aquatilis Wasseradex

Lupus Wolff

Lupus ceruarius lups

Lutra otter

Martes steinmarter/vnd paummarter

Meles days

f

Melium

ANIMANTIVM

Melium ein halsband dar vnd days
gefuttert / so man den hunden
anlegt

Mολογρίδες Faulkroten

Musalpinus murmelthier

Musaraneus ratte

Mus lassicius lassitz

Mus Noricus pile

Mus Pannonicus

Mus Ponticus hermlein

Mus aquaticus Wasserm Maus

Mus subterraneus schörm Maus

Mus sylvestris haselmaus

Mustela domestica Wisel

Mustela sylvestris iltes

Μυγάλη ratte

Μύς σκίουρ & eichorn

Noerza noerz

Platyceros damhirs

Pulices terreni erdsloh

Πυρίφρων & feürtrote

Rana

NOMINA

Rana rubeta Krote

Rana temporaria reinfroschlein

Rana uenenata fossilis feurKrote

Rana uiridis parua laubfrosch

Ranæ uirides, subliuidæ, subcine-
reæ frosche

Rupicapra ein gemp des hornes
hinderzich gebogen sein

Salamandra molch

Scarabeus, de quo hic loquimur,
sewKer

Σχιουρ eichorn

Sorex spizmaus/feltmaus

Stellio Tarantula

Talpa molwurff

Tarandus reen

Testudo schiltKrote

Tragelaphus brandhirse

Vermis in Maio natus meiworm

Viueria furette vnd hamster

Vormela Wormlein

2...

f 2

Vrsus

ANIMANTIVM

Vrfus beer

Vulpes fuchs

Zobela zobel

VOLANTIVM

Alauda lerch

Anas immanfueta Wilde ente

Anser immanfuetus Wilde gans

Apis pien

Apod'es fpi'schwalben

Aquila adler

Ardeola reiher

Attagen haselhu'n

Bubo gros huhu

Ciconia ftozd

Cornix krahe

Coruus aquaticus Wafferrabe

Coruus, cuius caput rubra macu-
la eft infigne holkrahe

Coruus nocturnus nachtrabe

Crabro horlitz

Cuculus

NOMINA

Cuculus Eucküch

Kύτταγί spirschwalben

Fulica Wasserhun

Galgulus hemmerling

Gryllus domesticus haushaim

Gryllus agrestis feldheim

Halcyon fluuiatilis eisvogel

Hirūdines domesticæ hausschwal

ben agrestes maurschwal

ben ripariæ spirschwalben

Ibis auis Ægyptia Germanis igno
ta

Ικτὶν hemmerling

Locusta heuschrecke

Mergus teucher

Merula amssel vnd schamssel

Miluus Wei ader hunerarb

Noctua schlaerule/stockeule/steineule

Νυκτιγόραξ nachtrabe

Olor schwan

Onocrotalus schnegans

f 3

Palum

ANIMANTIVM

Palumbes holztaube vnd ringel-
taube

Perdix rāphun

Pica agelester

Picus specht

Πυρρὸνόραξ holkrahe

Querquedula Erihentlein

Sturnus stār

Tetraones pirczhuner vnd auerhān

Turdus Kramervogel/ zimer/ Wein
drusschel/zipdrusschel

Vespa Wespe

Vespertilio fledermaus

Vlula huhu

Vpupa Widehopfe

Vultur hasengeir

NATANTIVM

Alburnus Weissfisch

Asellus, in Italia Asino

Aurata, Venetijs Auraia

Barbus

NOMINA

Barbus parme

Buccinum, in Liguria corneto

Cancer fluuiatilis Krebs

Conger, in Italia congro

Coracinus, Neapoli coracino

Delphinus mehrschwein / dar von
Kompt falspect

Esox lays

Glaucus

Gobio fluuiatilis Schmerle

Hippurus

Lucius hecht

Merula, Massiliae roquando

Murena, in Italia murena

Orphus, in Sicilia cernha

Pisces fossiles peisler vnd merput-
ten / qui sunt crassiores

Pecten, Venetijs cappe

Perca berse

Primadia

Purpura, in Græcia porphyro

f 4

Raia

ANIMANTIVM

Raia roch
 Salar fhure
 Salmo salm
 Sturio stôr
 Thynnus thunno
 Turdus, Mafsiliae roquando

SERPENTIVM

Acontias, ignotus Germanis
 Amphisbæna, ignota
 Aspîs, ignota
 Boa vnke
 Basiliscus, ignotus
 Cæcula blindschliche
 Calabricus serpens, ignotus
 Χείρονος & natter
 Cenchris, ignota
 Ceraſtes hornichreſchlange
 Diplas, ignota
 Draco drach
 Dryinos eichſchlange

Hæmor

NOMINA

Hæmorrhous, ignotus

Natrix natter

Porphyrus, ignotus

Scytale, ignota

Sepedon, ignota

do **Τυφλίω** blindschleiche

Τυφλώ blindschleiche

Vipera, *Italis maraffo*

is **Υδρ** natter

VERMIVM

Ascarides erdworme

Lumbricus reinworm

Spondylis engerle

Teredo Pufferworm

DAEMONVM

Demon subterraneus truculentus

bergteufel mitis bergmen-

nel/Kobel/guttel

f 5

INDEX IN LI=

BRVM PRAECEDENTEM

A

A Contias	65.66
Aelianus	4.65
Aenariae coloni terrae motu & calidarū aquarū effusionib. sedibus exacti	10
<i>Ανδροχόισ</i> , qui & histrix	43
Alaudae 16 hyeme latent in cauernis montium	53
Albertus Magnus	11
Alce	24
Ambrosius Fabianus	68
Amphisbæna	60
Anates immansuetæ	14
Animal incognitum repertum in Nori- co	11
Animantes subterraneæ quæ proprie & sint & dicantur 9.69 quæ in terra sic ca 70 quæ in humida agant	73.74
Animantium subterranearum tria gene- ra	16
Animantes omnes natura mutationem sentire	9
Ani	

I N D E X

Animantes quæ in regionē ē qua egres- sæ sunt non reuertuntur 9.10.11 quæ reuertuntur	12.13
Animantes frigoris aut caloris uitandi causa locum mutantes	12.13
Animantes quæ noctu uel interdiu in ca- uernis terræ delitescunt 16.17.18. & deinceps	
Animantes quæ in terra latēt aliquo an- ni tempore 30.31.32. & deinceps usq; ad pag.70	
Anseres immansueti	14
Aper	24
Apes	15
Αποδεις, quæ & κυψιλοι	52
Aquaticilia quę aliqua anni parte se in coe- no uel arena condunt	53
Aquila Northusæ mortua	11.12
Aquila à Ianio Dincelspyhelenfi occi- sa	12
Aranei nigri	51
Aratus	57
Ardeola	14.26.33.47
Aristoteles	4.8.49.64
Aristophanes	28
	Arces

INDEX

Arces subterraneæ	18
Ascalabus, & ἀσκαλάβωτος, qui & stel- lio	49
Ascarides	70.73
Aselli rimis parietum occultantur	15
Asellus piscis æstivis mensibus se con- dit	53
Asio nocturæ species	28
Aspis, & eius genera	62.63
Attagenes	14
Aves hyeme in cauis arboribus laten- tes	15.16
Aves luteæ	8
Aves quædam cur uerno tempore con- spiciantur implumes	16
Aves nocturnæ	27
Aurata æstivis mensibus se condit	53
B	
Basiliscus	66.67
Βαβαχίδης	57
Blattæ parietum rimis occultantur	15
Boæ ex natricum genere	62
Βρεφας, rana	56
Bubo	27.53
Buccina	53
Bufo	

INDEX

Bufo	57
C	
C ancer fluviatilis	58
C alabricus serpens	61
Caprea	24
Cassianus theologus	67
Κάσσιος	24
Castorea	24
Caucasus mons	17
Causon quæ & dipfas	60
Cæcula hyeme se condit in terra	60
Cellæ subterraneæ	12
Cenchris serpens	66
Centipeda quæ & scolopendra	51
Cephi Aethiopici	11
Cerastes	64
Cervus	24
Ciconiæ	14
Chamæleon 46.47 aura alitur	49
Χαμαιτυπεία	19
Chelydros	64
Chersydros	61
Cicero	68.70
Circe	18
Cleopatra aspidas ptyadas sibi admouit	

INDEX

Columella	60
Cœnobium subterraneū in Sedunis	18
Corpus subterraneum & eius diuifio	7
Coruus aquaticus	14
Coruus qui πυρρόραξ	16
Coruus piscis hybernis menfibus fe con dit	53
Conger	53
Cochleæ	53
Cochleæ cauaticæ	70.73
Colubri Thebani cornuti	64
Crabrones fylueftres	15
Crocodilus 53.54 ad infulam Tenty- ritarum non adnatat	55
Cuculus	16
Cuniculus	20
Cymbri	10

Vide etiam in Kappa.

D

D Ama	24
Dantifci bona pars uulgi fub terra habitat	20
Dæmones fubterranei, & eorū duplex genus	76.77.78
Delphinus	53
Delphi	

INDEX

Delphinus hostis crocodili	55
Dioscorides	3
Dipsas	59
Domus in Armenia maiori quales	17
Draco 67 cum aquila & elephante pugnat	68
Dryinos	63

E

E λεός Aristoteli glis dictus	33
Erinaceus hyeme in cauis arborib. se condit	15.22.30
Efox	14
Εχιδνα	58

F

F iber, & eius descriptio	22, 23, 24
Fibri pelles & testes	24
Formicæ	15
Fossæ Prenestinae	19
Fulica	14
Fulvius Hirpinus uiuaria gliribus instituit	35

G

G άλγυλος	13
Γαλιώτης, qui & stellio	49
Galenus	63
Γάλα	

INDEX

ράλα, quæ uisela	37
Ganeum	19
Glaucus piscis hybernis mēlibus se con-	
dit	53
Glis	15.32.33.34
Glis Fennicus	33.34
Gliraria	34
Gothi ex Scandia in Sarmatiam & Da-	
ciam	10
Grues ab ultimis quasi terris in ultimas	
discedunt	14
Grylli domestici, agrestes	51
γύεινοι	57

H

H Alcyones marinæ, fluuiatiles	26
Hamester qui à quibusdam crice-	
tus	41
Hamestri appellatio in hominem uora-	
cem apud Germanos	42
Hæmorrhoids	64.65
Hippurus piscis	53
Hirundines hyeme in loca tepidiora se-	
cedunt	53
Hirundines ripariæ, quæ & ἀποδιδ- &	
κύνειλοι	52
Histris	

INDEX

Histrix hybernis mensibus in specus se-	
cedit	43
Histricis descriptio	43
Hoensteinum	19
Homerus	18
Homines cauernas succedentes, qui ex	
eo Troglodytæ	17.29
Homines sylvestres Scricfinniæ	17
Hydros	61.64

I

I Aculus serpens	65.66
Ibex	24
Ibis Aegyptia 67 in Alpibus uisa	11
Ichneumon crocodilo inimicus 54 aspi-	
di	63
ιατφ	13
ιαπς mustelæ genus	38.63
ιαπδ pellis, prouerbiū apud Germa-	
nos in uilissimū & maxime foetidum	
scortum	38.39

K

K Αλαμίτγ rana	56
καμψιδρ, Latinis glis	33
κικαβαῦ, sonus quem ululæ edunt	28
κίεαλοι, daemones hominum imitato-	
res	

INDEX

res	77
κύνες, quæ & ἀποδε	52

L

L Acerta Chalcidica quæ & seps Lacerta hybernis mensibus in terra latet Lacerta à stellione quomodo differat	46 45 49
--	----------------

Lacerta aquatilis	46.53
Lacerta uiridis	28
Lagopus	26
Lepus	24
Locustæ in Pannonias, Daciam & Lygi os proximis annis inuolarunt	11
Lubeci bona pars uulgi sub terra habi- tat	26
Lucanus	66.68
reprehensus	61
Lumbrici	70.73
Lupus	24
Lupus ceruarius	24
Lurida, auis	13
Lutra, & eius descriptio	20.22.23

M

M Artialis Meles caninus suil	34.39 20.21.24.25
---	----------------------------------

INDEX

suillus	25
Melia	26
Mergus	14
Merulæ	16.53
Merula piscis	53
μόλυν Græco nomine Germanis, quæ salamandra	50
μολούειδω ranæ	57
Mus Alpinus	30.31.32.33
Mus araneus, qui & μυγάλη	36.37.71
Mus aquaticus	58
Mus sylvestris	36
Mus Lascivus	35
Mus Noricus, qui citellus	35
Mus Ponticus	15.35
Mus Pannonicus	36
μῦς σκίρτος	33
Mus subterraneus, qui & agrestis	70.71
Multipeda & milipeda, quæ & scolopendra	51
Murena hybernis mensibus se cōdit	53
Mustela quæ proprie γάλη 37 quæ ἰαπε 38 quæ martes 39 quæ Germanis zobela	40
Mustelarum virus basilisco exitio	67
g 2 Natrix	

INDEX

N

N atrix hyeme in caua terræ ingre-	
ditur 61 eius genera	61.62
Nicāder	49.57.60.64.66 reprehēsus 59
Nitedula	70
Noerza	40
Noctua	27.28.53
Noctuarum genera	28
Nycticorax	27.28

O

O lores	14
Onocrotalus	14
Opianus	4
Orphus piscis hybernis mēlibus se con-	
dit	53
Ouidius	30
Oua serpentium in ignem cōiecta flam-	
mam restinguere	50

P

P alumbes	16.53
Pecten	53
Perca	53
Perdix	14
Perfarum reges hyberno tēpore Baby-	
lone, uerno Susis, æstiuo in Ecbatanis	
dege	

INDEX

degebant	13
ῥυελφρω	71
ῥυῶ, rana rubeta	57
Picus	16
Pisces uitandi caloris & frigoris gratia	
mutant locum	14.15
Pisces fossiles	75.76
Platyceros	24
Plinius	4.11.25.35.52.62.63.64.66.70
72.73 reprehensus	56.57.59
Polybius	48.75
Porphyrus	4
Porphyrus serpens	65
Prestera à dipsade differt	60
Preneſtinæ fossæ	19
Primadiæ	53
Psellus	77
Psyllorum olfactu serpentes fugant	55
Pufhardum	18
Purpura	53
ῥυελφρω, bestiolæ	8

Q Verquedula ^Q 14

R 3 Raia

INDEX

R

R Aia	53
Ranarum diuersa genera	56.57
Rana rubeta	57.58
Rana quæ καλαμίτης	56
Ranæ temporariæ	56
Rana uenenata	70.71.72
Renum doloris medicamentum	25
Reinesteinum	18
Rupicapra	24

S

S Al inimicum lacertæ aquatili	46
Salamandra, quæ Germanis Græco nomine μόλυσ	50.51
Salmo	14
Scandia	10.17
Scarabei rutili	51
Scolopendra	43.51
Scricfinniæ syluestres homines	17
Scytale	60
Σκίρθ	33
Seneca	76
Sepedon	69
Seps seu lacerta Chalcidica	46
Serpentes hyeme latentes	58.59
Serpens	

INDEX

Serpens Calabricus	61.62
Seruius	70
Sorex	36
Spondylis uermis	70.72
Stellio	49
Sturio	14
Sturni	16.53
Subterraneum corpus, & eius diuifio	7
Sibyllæ Cumææ antrum	17

T

T Alpa	70
Tarandus	24
Tenedi infulæ piscatores rupium specu bus pro domibus utuntur	17
Tentyritæ	55
Teredo	69
Terrarum quasdam oras onera, qui- bus premuntur in alias sæpe depone- re	10
Tetraones	14
Teutones	10
Thebani colubri	64
Theophrastus 3.8.74.76 reprehē- sus de piscibus subterraneis	75
Testudo terrestris	51

INDEX

Thynnus	14.53
Tragelaphus	24
Troglodytæ	17.29
Trochilos crocodilo dentes & fauces re purgat	54
Trulli dæmones	78
Turdi	16.53
Turdus piscis	53
Turtures hyeme in cauernis montium latent	16.53
τυφλῖνΘ, τυφλῶψ	69
V	
VArro	25.28.34
Vermis quadrupes in Maio na- tus	54
Vespertilio	27.28.29.53
Vespæ	35
Vipera quæ ἐχιδνα	58.59
Virgilius	61.70.71
Vísela quæ γάλα	37
Viueria	25.41
Vlula	27.53
Volucres quæ hyeme se condunt in ter- ra	52
Vormela	42
Vpupæ	

INDEX

Vpupæ	16.53
Vrfus	44.45
Vulpes	20.21.22
Vultur	14

x

X Enophon	17
-----------	----

z

Z Obelamustelæ species	40
------------------------	----

DE ANIMANTIBVS SVBTERRA-
NEIS INDICIS FINIS

CASTIGATIONES LIBRORVM De ortu & causis subterraneorum

Pag. 10. uers. 4. quibus, non quas 11. 17.
efficiūt 34. foderint 40. trāsiret 13. 25
circumstetit, non circumserpīt 14. 40.
quia aquis calidis scaturiūt 18. 27. Elbo
ga 30. 22. differpunt, non discerpunt
48. 34. lapides enim plerosq; omnes ui-
demus bene compactos & coagmenta-
tos solidosq; 54. 36. oritur 61. 23. ami-
antum 65. 31. amianto 39. amiantus
66. 4. amiatūs 8. amiantū 70. 29. Mau-
ritanus 74. 33. nituntur.

Castigationes quatuor librorum De na- tura eorum quæ effluunt ex terra.

86. 32. Strato Lampfacenus 87. 16. uo-
litent 89. 8. persequunt 36. octingēta
99. 9. sub Desteromonte 14. Vicelebio-
rum 101. 5. acidulæ 102. 19. in Sicilia
Palicorum fons 113. 16. chiragræ 30. ni-
mis frigidæ 114. 24. colicis 117. 9. la-
custres 119. 9. Iusgū, nō Cescū 120. 27
Cassinitū 122. 32. Salone, nō Sulmone
127. 31. quæ ad meridiem 128. 22. Don-
dorfi

dorfi 35. fontem Palicorum in Sicilia
 135. 18. Appia, nō Appiana 19. Cimina,
 non Cumina 136. 35. tēperet 141. 37.
 nimis autem frigida 144. 32. & aquæ
 instar, non & tanq̃ aquæ instar 149. 23.
 plethrum, nō iugerū 150. 26. per quen-
 dam quasi cuniculum cæcū: aut in altum
 per quendam quasi puteū cæcum. uterq̃
 autem, &c. 154. 31. Fesulanos 155. 35.
 quoad caruerit 162. 35. Bithyniæ 163.
 25. Hirsepergenes 30. Vetulonios.

Castigationes decem librorum De
 natura fossilium

174. 32. nauseam 183. 27. possunt. 190.
 33. aquis mollitæ, uel manu subactæ
 200. 26. etenim dicit eam, non etiam
 203. 37. in modico 212. 29. in terra reper-
 tum aut cæditur 30. id, nō is 216. 5. quo-
 uitrum uitro iungitur 217. 33. refertum
 non repertū 223. 37. Suditorū 234. 6.
 circumdat 254. 37. illinēdi 256. 34. 36.
 illinendi 257. 22. Desteri 264. 8. nitro,
 non intro 267. 22. Motescha 268. 24.
 callimus 287. 12. unde eadem, nō unde
 & eadem 289. 2. genus, non pellucens
 24. sma

24. smaragdi 292.27. separatur 301.34
 perraro autem talis est 305.19. & pumi-
 cosa, non est pumicosa 341.30. & colo-
 ris. & omittendum 345.35. quem Gre-
 canicam uocant 17. aris uero decē, non
 uiginti 361.18. quē habent 374.36. illa
 complectitur uel argentū, uel argētum
 uiuum: hæc, &c.

Castigationes librorum De uete- ribus & nouis metallis

387.15. exponenda 388.20. & ut ait En-
 nius 402.28. amnis 403.37. nō unum
 abundat 405.12. autem 406.1. tractus
 Vispani 409.21. μεταχαιρον 34. Torin-
 giam

Castigationes Bermanni

426.2. Pleistadum 430.7. interea nihil,
 desideramus 432.18. ducentorū ferme
 passuum, non orgyarum 21. quingentos
 passus alti, non orgyas 439.28. adiudi-
 candum 444.19. ne quid inflammatis.

FINIS

**BASILEAE APVD FROBENIVM
ET EPICOPIVM MENSE AV-
GVSTO M. D. XLIX.**



